

“تميم بالفاكس”

الموضوع: احتمالية حدوث اعراض جانبية خطيرة بالتزامن مع استخدام مستحضر Domperidone

رقم التعميم: ٣٥٥٨٦ / ع / ٩١٩ / ١٤٣٥

الموفر	معالي نائب وزير الصحة للشئون الصحية
الموفر	معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني
الموفر	معالي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض
الموفر	سعادة وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية
الموفر	سعادة وكيل وزارة الصحة للإمداد والشئون الهندسية
الموفر	سعادة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة
الموفر	سعادة مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
الموفر	سعادة مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
الموفر	سعادة مدير عام الاستخبارات العامة
الموفر	سعادة مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الشئون الاجتماعية
الموفر	سعادة مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم
الموفر	سعادة المدير التنفيذي لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل
الموفر	سعادة المدير التنفيذي لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية ببنين
الموفر	سعادة نائب رئيس شركة ارامكو السعودية للخدمات الطبية
الموفر	سعادة عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود والمشرف العام على المستشفى الجامعية
الموفر	سعادة عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
الموفر	سعادة المشرف العام على مستشفى الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز للطب裡اضي
الموفر	سعادة عميد كلية الطب بجامعة (الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني/الملك خالد بعسير/الأمير سلمان بن عبد العزيز بالخرج / الإمام محمد بن سعود بالرياض / أم القرى/ طيبة بالمدينة المنورة/ القصيم / الدمام / الجوف / جازان / الطائف / نجران / المجمعة / تبوك / الباحة / حائل / الحدود الشمالية)
الموفر	سعادة مدير عام مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي على مدينة الملك فهد الطبية
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
الموفر	سعادة المدير العام على مدينة الملك سعود الطبية
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي على مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة
الموفر	سعادة المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأمراض الكلى
الموفر	سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»
الموفر	سعادة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالملكة العربية السعودية
الموفر	سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض/مكة المكرمة/المدينة المنورة/القصيم/الشرقية/عسير/حائل/الحدود الشمالية/الباحة/نجران/جازان/الجوف/تبوك
الموفر	سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف/جدة/الإحساء/بيشة/حفر الباطن/القريات/القنفذة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

إشارة الى التحذيرات الواردة للهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص إمكانية حدوث اعراض جانبية خطيرة مثل الموت القلبي المفاجيء (sudden cardiac death) والرجفان البطيني

(domperidone) بالتزامن مع استخدام مستحضر (ventricular arrhythmia)، فقد قامت الإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات بعمل مراجعة تهدف إلى دراسة مدى الارتباط بين حدوث هذه الأعراض الجانبية الخطيرة بالتزامن مع استخدام مستحضر (domperidone)، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه العلمية في اجتماع فريق عمل التيقظ الدوائي الاستشاري رقم ٢٢ وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٥هـ تبين ما يلي :

- ١ تشير بعض الدراسات إلى وجود زيادة ملحوظة في فرصة حدوث الموت المفاجي (domperidone) بالتزامن مع استخدام مستحضر (sudden cardiac death) خصوصاً عند استخدامه بجرعات كبيرة ولفترات طويلة.
- ٢ وجود عدد من التقارير التي تربط بين استخدام مستحضر (domperidone) مع فرصه حدوث الموت القلبي المفاجيء والرجلان البطيني في قاعدة بيانات رصد الاعراض الجانبية لدى منظمة الصحة العالمية (Vigibase- WHO)، غير أن هذا الارتباط غير ملحوظ (non-significant).
- ٣ بناء على الأدلة والبراهين المتوفرة لا تزال فاعلية استخدام مستحضر (domperidone) تفوق الاضرار المحتملة وذلك عند استخدامه لعلاج الغثيان والقيء فقط ولفترة قصيرة وبجرعات منخفضة.

عليه نأمل من معاليكم / سعادتكم التلطيف بالتعليم على الممارسين الصحيين التابعين لدى إدارتكم بضرورة اخذ ما يلي بعين الاعتبار :

١. حصر استخدام مستحضر (domperidone) لعلاج الغثيان والقيء فقط. وان لا تتجاوز الجرعة اليومية للمراهقين والبالغين اللذين يزنون أكثر من ٣٥ كيلوجراماً عن ١٠ ملجم ثلاث مرات يومياً عن طريق الفم او ٢٠ ملجم مرتان يومياً عن طريق الشرج لمدة أسبوع،

كما يجب ان لا تتجاوز الجرعة للأطفال ومن هم دون ٣٥ كيلوجراما على ٢٥ ملجم لكل كيلوجرام ثلاث مرات يوميا ولمدة أسبوع.

. ٢. منع استخدام مستحضر (domperidone) للمرضى الذين لديهم فشل في القلب ، نوبات قلبية سابقة (heart failure)، ذبحة صدرية (heart arrhythmias) أو عدم انتظام نبضات القلب (angina)

وتؤكد الهيئة العامة للغذاء و الدواء استمراريتها في متابعة ورصد كل ما يستجد من معلومات تخص سلامة و مأمونية المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في المملكة. وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة www.sfda.gov.sa ، كما تحت الهيئة ممارسي الرعاية الصحية على إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية جراء استخدام المستحضرات الصيدلانية، وذلك بإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد المجاني على العنوان التالي:

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية
الهيئة العامة للغذاء والدواء - قطاع الدواء
٢٢٩٢ الطريق الدائري الشمالي - حي النفل
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠ أو ٠١١٢٠٣٨٢٢٢ تحويلة ٢٣١٧، ٢٣٥٦، أو ٢٣٤٠
فاكس: ٠١١٢٠٥٧٦٦٢

بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

وتقبلوا خالص التحية و التقدير،،،

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

أ.د. صالح بن عبدالله باوزير

٩١٥

عنة د/هادى بن محمد بن هاجد

٥١٥

٥١٣

Restrictions on the use of domperidone

The Saudi Food and Drug Authority (SFDA) would like to inform healthcare professionals that it has evaluated the safety profile of domperidone, a peripheral dopamine D2- receptor antagonist with gastrokinetic/antiemetic properties, following concerns on its association with risk of serious adverse reactions.

The review concluded that the use of domperidone might be associated with serious adverse reactions such as sudden cardiac death and ventricular arrhythmia. Therefore, the following recommendations must be followed in order to ensure the positive risk/benefit balance of this product:

1. Domperidone should only be used to treat nausea and vomiting.
2. In adolescents and adults weighing 35 kg or more, the daily dose of domperidone should not exceed 10 mg three times daily by mouth or 30 mg twice daily as suppositories. In children and those weighing less than 35 kg, the dose should not exceed 0.25 mg per kg three times a day. The medicine should not normally be used for longer than one week.
3. Domperidone should not be used in patients with certain heart conditions including heart failure, previous heart attack, angina (chest pains) and heart arrhythmia disorders.



For further information please contact us using the following information:

National Pharmacovigilance and Drug Safety Center (NPC)

Saudi Food and Drug Authority-Drug sector

3292 Northern Ring Road

Al Nafal District

Riyadh 13312 – 6288

Kingdom of Saudi Arabia

Toll free number: 8002490000

Tel: 0112038222 ext. 2317, 2353, 2356, 2340, 5721

Fax: 0112057662

Email: npc.drug@sfda.gov.sa

You are also encouraged to report any adverse events through this link:

<https://ade.sfda.gov.sa>