



### بطاقة تحذير خاصة بالمريض

## ليكسيانا<sup>®</sup> أقرص مغلفة إيدوكسابان

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات.

يرجى عرضها على أخصائي الرعاية الصحية أو صيدلي أو الجراح أو طبيب الأسنان قبل أي علاج أو تدخل طبي.

49 mm

50 mm

51 mm

53 mm

52 mm

- براز بلون القطران
  - دوخة أو صداع مفاجئ
  - التعب غير المبرر
  - نزيف مهبلي غير طبيعي، بما في ذلك حيض أثقل أو ذو فترة ممتدة.
- يرجى التحدث مع طبيبك إذا كنت تواجه أي أعراض غير عادية.

**متى تطلب نصيحة طبية**  
**خطر النزيف**  
إن تناول مضادات التجلط مثل ليكسيانا قد يزيد من خطر النزيف.

ولذلك فمن المهم أن تكون على علم بالعلامات المحتملة وأعراض النزيف وأن تتحدث إلى طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا مما يلي:

- كدمات أو نزيف تحت الجلد
- دم في البول
- سعال الدم
- تقيؤ الدم أو مواد تبدو مثل البن المطحون
- نزيف الأنف أو الجروح التي تأخذ وقتًا طويلاً لوقف النزيف

لا تتوقف عن أخذ ليكسيانا دون استشارة الطبيب لأن هذا يمكن أن يزيد خطر تكوّن جلطة دموية. يُرجى قراءة النشرة التي ستجدها داخل علبة ليكسيانا.

**معلومات بشأن علاجك**  
لقد تم وصف ليكسيانا لك و هو دواء مضاد للتجلط يقوم بتثبيق دمك و يُساعد على منع تكون الجلطات الدموية.

من المهم أن تأخذ الدواء تمامًا كما وصفه الطبيب.

**إذا أغفلت تناول ليكسيانا**  
يجب عليك تناول القرص الذي أغفلته فورًا، ثم تابع اليوم التالي تناول قرص واحد مرة يوميًا كالمعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة باليوم نفسه لتعويض جرعة أغفلتها.

لا تبدأ تناول أي أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية) دون استشارة الطبيب.





معلومات المريض	معلومات العلاج	معلومات الطبيب	معلومات المريض	معلومات المريض
<p>اسم المريض: .....</p> <p>تاريخ الولادة: .....</p> <p>في حالة الطوارئ، يرجى الاتصال ب: .....</p> <p>اسم: .....</p> <p>رقم الهاتف: .....</p>	<p>(تُستكمل من قبل الطبيب)</p> <p>لقد تم وصف ليكسيانا جرعة مرة واحدة يوميا: .....</p> <p>ملح.....</p> <p>بدأت في:..... /..... (الشهر / السنة)</p> <p>فصيلة الدم:.....</p> <p>أدوية أخرى / الشروط: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>لمزيد من المعلومات أو في حالة الطوارئ، يرجى الاتصال ب: .....</p> <p>اسم الطبيب: .....</p> <p>رقم الهاتف ، وختم الممارسة: .....</p> <p>توقيع الطبيب: .....</p> <p>.....</p>	<p>معلومات للعاملين في الرعاية الصحية</p> <p>ينتمي ليكسيانا إلى مجموعة من الأدوية تدعى مضادات تجلط حاصرات العامل العاشر أ.</p> <p>إذا كنت تحتاج إلى الخضوع إلى عملية جراحية، يجب وقف تناول ليكسيانا قبل إجراء الجراحة بـ ٢٤ ساعة على الأقل مع اتخاذ إجراءات الحيطة المناسبة.</p> <p>ليكسيانا قد يزيد من خطر النزيف. في حالة النزيف، يجب وقف العلاج على الفور.</p> <p>اختبارات التخثر مثل INR، وقت البروثرومبين (PT)، أو تنشيط وقت تجلط الدم الجزئي (aPTT) لا تعد مقياسا مفيدا لتأثير ليكسيانا.</p>	<p>ومع ذلك، فإن معايرة نشاط العامل العاشر أ قد يساعد في القرارات السريرية.</p> <p>يرجى الاطلاع على ملخص خصائص المنتج (SPC) للمزيد من المعلومات.</p> <p>للحصول على أية معلومات حول هذا الدواء، يُرجى الاتصال بـ الشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية، شركة محدودة - المملكة العربية السعودية</p> <p>ص.ب: ٠٠٦٢٤، جدة ١٥٥١٢، المملكة العربية السعودية</p> <p>هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٦٦٦٧</p> <p><a href="http://www.sajapharma.com">www.sajapharma.com</a></p> <p>تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في (مارس/٢٠١٧)، إصدار رقم (٠٠) للإبلاغ عن أي أثر جانبي (آثار جانبية)</p> <p>المملكة العربية السعودية:</p> <p>المركز الوطني للتنسيق الدوائي والسلامة الدوائية</p> <p>ه فاكس: +٩٦٦-١١-٢٠٥٠٧٦٦٢</p> <p>ه الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠</p> <p>ه البريد الإلكتروني: <a href="mailto:npc.drug@sfd.gov.sa">npc.drug@sfd.gov.sa</a></p> <p>ه الموقع على الإنترنت: <a href="http://www.sfd.gov.sa/npc">www.sfd.gov.sa/npc</a></p>

49 mm

50 mm

51 mm

53 mm

52 mm

