



Saudi Arabia: P.O. Box 16032, Riyadh 11464, Tel: +966 11 465 8882  
 DS&E  
 Phone: +966 11 265 8100  
 Fax: +966 11 265 8107  
 Email: adverse.events@novartis.com  
 SFDA  
 You can report any problem through:  
 Toll free phone: 8002490000  
 Fax: +966-11-205-7662  
 E-mail: npc.drug@sfd.a.gov.sa  
 Or by online: <https://ade.sfd.a.gov.sa/>

الملكة العربية السعودية، صندوق بريد 16032، الرياض  
 هاتف: +966 11 265 8100 ، +966 11 465 888  
 الفاكس: +966 11 265 8107  
 بريد الإلكتروني: adverse.events@novartis.com  
 يمكنك الإبلاغ عن أي مشكلة من خلال:  
 خط مجاني: 8002490000  
 الفاكس: +966-11-205-7662  
 بريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa  
 أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfd.a.gov.sa/>



References: 1. Exelon Patch (vastigline transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references] 2. Exelon Patch (vastigline) Prescribing Information

**١. كيفية وضع الدواء على الجسم**

١. يجب وضع الدواء على الجلد نظيف وجاف تماماً.  
 ٢. تجنب وضع الدواء في المناطق التي بها جروح، حروق، التهابات، أو أي نوع من التهيجات الجلدية.  
 ٣. تجنب وضع الدواء في المناطق التي بها دهون، زيوت، أو كريمات.  
 ٤. تجنب وضع الدواء في المناطق التي بها شعر كثيف.  
 ٥. تجنب وضع الدواء في المناطق التي بها ندبات أو علامات تمدد الجلد.

**٢. كيفية التخلص من الدواء**

١. يجب التخلص من الدواء بطريقة آمنة.  
 ٢. تجنب التخلص من الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات.  
 ٣. تجنب التخلص من الدواء في حاويات زجاجية أو بلاستيكية.  
 ٤. تجنب التخلص من الدواء في حاويات معدنية.  
 ٥. تجنب التخلص من الدواء في حاويات ورقية.

**٣. الاحتياطات**

١. يجب تجنب القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة أثناء استخدام الدواء.  
 ٢. تجنب تناول الكحول أثناء استخدام الدواء.  
 ٣. تجنب تناول الأدوية الأخرى دون استشارة الطبيب.  
 ٤. تجنب التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء استخدام الدواء.  
 ٥. تجنب التعرض للبرد أثناء استخدام الدواء.

١. يجب تجنب القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة أثناء استخدام الدواء.  
 ٢. تجنب تناول الكحول أثناء استخدام الدواء.  
 ٣. تجنب تناول الأدوية الأخرى دون استشارة الطبيب.  
 ٤. تجنب التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية أثناء استخدام الدواء.  
 ٥. تجنب التعرض للبرد أثناء استخدام الدواء.