تحتوي هذه البطاقة التنبيهية على معلومات مهمة بخصوص الأمان ويجب أن تكون على دراية بها قبل وأثناء العلاج باستخدام ريميكيد.

قدّم هذه البطاقة لأي طبيب يشترك في علاجك.

يُرجى قراءة "النشرة الدوائية للعبوة" الخاصة بعقار ريميكيد بدقة قبل أن تبدأ استخدام هذا الدواء.

يُرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة كمرجع عندما تبدأ بطاقة جديدة، وذلك لمدة 4 شهور بعد هذا التاريخ.

تاريخ الإعداد: (أكتوبر 2017)

حقن ريميكيد عن طريق الوريد تاريخ إعطائه

السنة	الشهر	اليوم
السنة	الشهر	اليوم

الموعد المقرر للحقن عن طريق التسريب

السنة	الشهر	اليوم
السنة	الشهر	اليوم

بدء العلاج يوم/شهر/سنة

الجرعة المعطاة (ملجم)	الجرعة الجرعة (ملجم/كجم) (ه	وزن الجسم الجرعة
(منجم)		(کجم)

يرجى التأكد من حيازتك لقائمة بجميع الأدوية الأخرى التي تستخدمها في أي زيارة إلى أحد اختصاصيي الرعاية الصحية.

احتفظ بهذا البطاقة معك لمدة 4 شهور من تاريخ جرعتك الأخيرة من ريميكيد. قد تحدث آثار جانبية بعد فترة طويلة من الجرعة الأخيرة.

شركات (**جانسين**) الدوائية من (جونسون آند جونسون)

بطاقة

تنبهية

للمريض

رىمىكىد		
ریمیکید إنفلیکسیماب		
		الاسم
-		تاریخ المیلاد
السنة	الشهر	اليوم
		اسم الطبيب
		الرقم الهاتفي للطبيب

اطلب من طبيب تسجيل <mark>نوع اختبار الدرن</mark> (TB) أدناه:

ار	الاختبا
ć	التاريخ
ä	النتيجة
ار	الاختبا
č	التاريخ
ě	النتيجة

لاختبار
لتاريخ
لنتيجة
وتاريخ الكشف (أو الكشوفات) الأخير/الأخيرة
لاختبار
لتاريخ
<u> </u>
اريخ الحساسيات

_
قائمة بباقي الأدوية
فالمه ببافي الأدوية

معلومات هامة بخصوص الأمان

العدوي

- قبل بدئ العلاج أبلغ طبيبك إذا كنت مصابًا بأي عدوى حتى لو كانت طفيفة
- من المهم أن تبلغ طبيبك إذا كنت قد أصبت سابقًا بالدرن، أو لو كنت على
 اتصال وثيق بشخص مصاب بالدرن. سيجري طبيبك اختبارًا ليرى ما إذا
 كنت مصابًا بالدرن. اطلب من الطبيب تسجيل نوع وتاريخ كشفك الأخير
 كشوفاتك الأخيرة(للدرن على البطاقة).
- أبلغ طبيبك إذا كنت مصابًا بفيروس الالتهاب الكبدي(ب) أو اذا كنت تعرف أو تشتبه أنك حامل لفيروس الالتهاب الكبدي(ب)

أثناء العلاج باستخدام ريميكيد

- أبلغ طبيبك فورًا إذا أصبت بعلامات لأي عدوى. تتضمن العلامات كل من الحمى، والشعور بالإرهاق، والسعال (الدائم)، وضيق التنفس، ونقص الوزن، والتعرق الليلي، والإسهال، والجروح، ومشكلات الأسنان، وحُرقة أثناء التبول أو علامات شبيهة بالأنفلونزا.

الفشل القلبي

قبل بدء العلاج باستخدام ريميكيد

- أبلغ طبيبك إذا كنت مصابًا بأي مشكلات قلبية مثل الفشل القلبي البسيط

أثناء العلاج باستخدام ريميكيد

- أبلغ طبيبك فورًا لو لاحظت علامات على وجود مشكلة بالقلب. تتضمن العلامات كل من ضيق التنفس، وتورم القدمين أو تغيرات بنبض قلبك.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

هيئة العامة للغذاء والدواء (المركز الوطني للتيقظ و السلامة الدوائية)

بالبريد الإلكتروني علي npc.drug@sfda.gov.sa

الفاكس: ١١–٢٦٦٧٥٠٢

http://ade.sfda.gov.sa/ أون لاين الرقم المجاني ٢٠٠٠٩

أو يمكنك الاتصال بالمكتب العلمي للشركة البريد الإلكتروني GCC-PV2@its.jnj.com الفاكس: ١٥٩٦٠-١١-١٠٩٦٦