

ما الذى ينبغي أن أعرفه أثناء العلاج بأقراص زارلتو؟

◆ يؤدي العلاج بـ (زارلتو) الى سيولة الدم ويقي من جلطات الدم الخطيرة

◆ تناول (زارلتو) كما وصفه لك طبيبك المعالج تماماً وأحرص على تناوله بانتظام دون السهو عن أى جرعة لضمان استمرار حمايتك من أى جلطات محتملة

◆ لا تتوقف عن تناول زارلتو قبل استشارة طبيبك المعالج خشية من أى جلطات

◆ اخطر الطبيب بأى أدوية أو علاج تتناوله حالياً أو كنت تتناوله فى الماضى القريب أو تنوى تناوله فى الفترة المقبلة قبل بداية العلاج بزارلتو

◆ اخطر الطبيب أو الجراح أنك تتناول زارلتو قبل إجراء أى عملية جراحية أو علاج تداخلى

Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á

◆ الألام

◆ التورم أو الشعور بعدم الارتياح

◆ الصداع والدوار والضعف العام

◆ التعرض للكدمات المتكررة وغير المفسرة

◆ والنزف من الأنف ومن اللثة ونزف بطيء التوقف من الجروح

◆ طمث أو نزيف مهبلى أكثر من المعدل المعتاد

◆ دم فى البول وتلون البول باللون الوردى أو البنى أو برزاز أحمر أو أسود اللون

◆ سعال مصحوب بالدم أو تقيء الدم أو مادة تشبه البن المطحون

كيف أتناول زارلتو؟

◆ لتحصل على أقصى قدر من الحماية، تناول زارلتو على النحو التالى

5 مجم مع أو بدون طعام

10 مجم مع أو بدون طعام

15 مجم مع الطعام

20 مجم مع الطعام

بطاقة طوارئ المريض



زارلتو 2.5 مجم

زارلتو 10 مجم

زارلتو 15 مجم

زارلتو 20 مجم

اختر الجرعة الموصوفة لك

◆ أحمل هذه البطاقة دائماً معك

◆ أحرص على تقديم هذه البطاقة للطبيب أو طبيب الأسنان قبل أن يقوم بصرف علاج أو إجراء عملية جراحية لك

أنى أتناول علاج بأقراص زارلتو (ريفاروكسابان) لضمان "سيولة الدم"

الاسم

أمراض أخرى / علاج آخر

العنوان

تاريخ الميلاد

الوزن

فى حالات الطوارئ، الرجاء
الاتصال بالطبيب

اسم الطبيب

تليفون الطبيب

ختم / توقيع الطبيب

كما يرجى أخطار

الاسم

تليفون

درجة القرابة

معلومات هامة لمسئولى الرعاية
الصحية:

لا يعتمد على نسبة التوحيد القياسى للسيولة (INR) أى-أن-آر
كمقياس دقيق لسيولة الدم أثناء تناول العلاج بأقراص زارلتو