

Electronic Certificate

Document Number:	SA-UPAD-210008
Document Name:	Upadacitinib aRM Tool - Patient Alert Card - Arabic Version 2.0 - June 2021

Certification Statement

I hereby certify that I have examined the material referred to above and confirm that:

1. The piece has been approved according to the relevant Code, SOPs and Regulations
2. The information in the piece is balanced, accurate and a truthful presentation of the facts
3. When applicable, the content is consistent with the local Health Authority labeling document(s)
4. If applicable, the electronic version of the attached artwork is suitable for release to the market

Role	Signature
Medical Certification	Yasser Nour Medical Director 11-Nov-2021 11:41:35 GMT+0000

بطاقة تنبيه المريض

احتفظ بهذه البطاقة طوال الوقت

تمت مراجعة واعتماد هذه البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

معلومات الأمان الخاصة بعقار رينفوك®▼

(يوباداسيتيزيب) للمرضى

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة عليك أن تكون على دراية بها - قبل العلاج بعقار رينفوك® وأثناءه.

- اقرأ نشرة معلومات المريض للاطلاع على مزيد من المعلومات.

اسمك:

اسم الاستشاري - الذي وصف عقار رينفوك®:

رقم الهاتف الخاص بالاستشاري:

التاريخ الذي بدأ فيه العلاج بعقار رينفوك®:

الإصدار ٢٠٢١. تاريخ الاعتماد: يونيو ٢٠٢١.

<https://ade.sfda.gov.sa/>



abbvie

أظهر هذه البطاقة لأيٍ من أخصائيي الرعاية الصحية المشاركون في رعايتك الطبية - على سبيل المثال: طبيب الأسنان الخاص بك أو طبيب الطوارئ.

▼ يخضع هذا المنتج الدوائي إلى مراقبة إضافية. يمكنك المساعدة عن طريق الاتصال للإبلاغ عن الآثار الجانبية.

طلب المزيد من النسخ الرجاء الاتصال بشركة أبيفي بايوفارماسيوتيكالس جي إم بي إتش على الرقم ٠٠٩٦٦٥٥٨٢٨٢٠١٠

للإبلاغ عن أي أعراض جانبية خاصة بمستحضر رينفوك يرجى الاتصال على الخط الساخن بشركة أبيفي بايوفارماسيوتيكالس جي إم بي إتش ٠٠٩٦٦٥٥٨٢٨٢٠١٠ البريد الإلكتروني: MEAPV@abbvie.com

للاتصال بالمركز الوطني للتيقظ - هيئة الغذاء والدواء السعودية: فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢ - مركز الاتصال الموحد لهيئة الغذاء والدواء السعودية: ١٩٩٩٩ البريد الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/> | الموقع الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

خطر العدوى

- قد يزيد عقار رينفوك® العدوى القائمة سوءاً أو يزيد من فرصة إصابتك بعدوى جديدة - على سبيل المثال: السل أو الهربس النطافي أو التهاب الكبد الفيروسي.
- أخبر طبيبك فوراً إذا لاحظت ظهور علامات عدوى، مثل:
 - حُقّى، أو تعرق، أو قشعريرة، أو فقدان الوزن، أو سعال لا يزول - فقد تكون هذه علامات الإصابة بمرض السل.
 - طفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور - قد تكون هذه علامة على الإصابة بالهربس النطافي.
 - الشعور بالتعب أو قصر النفس - قد تكون هذه على الإصابة بالالتهاب الرئوي.

اللقاحات - التي تُستخدم للوقاية من العدوى

يجب عدم إعطاء اللقاحات الحية (على سبيل المثال: لقاح الإنفلونزا عن طريق بخاخ الأنف، الحماق/الحصبة/النكاف/الحصبة الألمانية) أثناء العلاج بعقار رينفوك®, أو قبل بدء العلاج بعقار رينفوك® مباشرةً.

قبل إعطائك أيّة لقاحات، تحدث إلى طبيبك - وهو سيعرف ما اللقاحات التي يجب عدم إعطائها لك قبل العلاج بعقار رينفوك® وخلاله.

الكوليسترونول

سيفحص طبيبك مستويات الكوليسترونول لديك أثناء تناولك لعقار رينفوك® - ذلك ليقرر هل ستحتاج إلى بدء تناول دواء لخفض مستويات الكوليسترونول لديك أم لا.

منع الحمل، والحمل والرضاعة الطبيعية

- يجب عدم تناول عقار رينفوك® أثناء فترة الحمل.
- استخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء تناول عقار رينفوك® - ولمدة 4 أسابيع بعد تناول آخر جرعة. تحدثي إلى طبيبك بشأن وسائل منع الحمل الفعالة.
- أخيرِي طبيبك فوراً إذا رغبت في الحمل، أو إذا أصبحت حاملاً.
- لا تمارسي الرضاعة الطبيعية أثناء استخدام عقار رينفوك®.

الجلطات الدموية في الأوردة (الخثار الوريدي العميق) أو الرئتين (الانصمام الرئوي)

- أخبرِي طبيبك على الفور إذا أصبت بعلامات تشير إلى الإصابة بالخثار الوريدي العميق:
- أو الانصمام الرئوي، مثل التورّم المؤلم للساقي أو الألم بالصدر.