


# رقعة ريفاكسيل<sup>®</sup> (امتصاص ريفاستيغمين عبر الجلد)

١.٦ ملجم/٢٤ ساعة \* ٩.٥ ملجم/٢٤ ساعة \* ١٣.٣ ملجم/٢٤ ساعة

١٦/٢

## متعقب الرقعة اللاصقة: الدليل الإرشادي لكيفية ومكان وضع الرقعة اللاصقة

- يجب ان تستخدم رقعة واحدة فقط من ريفاكسيل\*.
- قم باستبدال الرقعة المستعملة بأخرى جديدة كل ٢٤ ساعة\*.
- قم بتغيير مكان الرقعة كل يوم، يمكن وضع الرقعة بنفس المنطقة بشكل عام، ولكن ليس بالمكان نفسه المستخدم سابقا، كما يمكنك وضع الرقعة اللاصقة بنفس المكان ولكن بعد مرور ١٤ يوم من ازالة الرقعة السابقة.



\* استخدم رقعة لاصقة واحدة في اليوم لأعلى أو اسفل الظهر وذلك اذا خفت ان يقوم المريض بإزالتها، اذا لم يكن هذا الأمر محتملا فيمكنك الصاق الرقعة بأعلى الذراع أو الصدر.

اسم المريض: .....

اسم مقدم الرعاية: .....

الخطوة ١: اكتب تاريخ استخدام الرقعة اللاصقة، ضع رقعة ريفاكسيل للشخص الذي تقوم برعايته في موضع واحد من الأماكن الممكن استخدامها لوضع الرقعة اللاصقة.


الخطوة ٢: قم بتسجيل تاريخ استخدام الرقعة اللاصقة في المكان الذي استخدم لوضعها كما هو مشار اليه بالمواضع المحددة بالأسفل.

الخطوة ٣: بعد ٢٤ ساعة قم بإزالة الرقعة والتخلص منها.


الخطوة ٤: قم بتكرار الخطوة من ١ الى ٣ عند استخدام رقعة جديدة.

مثال


أعلى الذراع (يمين)




أعلى الذراع (يسار)




أعلى الظهر (يمين)




أعلى الظهر (يسار)




أعلى الصدر (يمين)





أعلى الصدر (يسار)



أسفل الظهر (يمين)



أسفل الظهر (يسار)



## استخدامات رقعة ريفاكسيل اللاصقة:

رقعة ريفاكسيل (آلية امتصاص ريفاستيغمين عبر الجلد) هي دواء يصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج مشاكل الذاكرة بدرجاتها: الخفيفة، المتوسطة، والحادة (الخرف) والتي ترتبط مع مرض الزهايمر.

## معلومات هامة للسلامة:

- لا ينبغي أن تستخدم رقعة ريفاكسيل إذا كان المريض يعاني من الحساسية تجاه أي من مكونات ريفاكسيل، بما في ذلك ريفاستيغمين العنصر النشط لرقعة ريفاكسيل.
- وينبغي أيضا ألا تستخدم إذا كان المريض كان له رد فعل تحسسي للجلد وانتشرت خارج اطار الرقعة، وتسببت ببثور، زيادة احمرار الجلد أو تورم، أو لم تتحسن هذه الأعراض في غضون 48 ساعة من ازالة رقعة ريفاكسيل.
- أدت الأخطاء في استخدام رقعة ريفاكسيل® (امتصاص ريفاستيغمين عبر الجلد) الى آثار جانبية خطيرة. تطلبت بعض الحالات التنويم في المستشفى، ونادرا ما أدت إلى الوفاة. وقد كانت ابرز الأخطاء بعدم إزالة رقعة الدواء اللاصقة القديمة ووضع الرقعة اللاصقة الجديدة فوقها واستخدام رقعة لاصقة متعددة في وقت واحد. **رقعة واحدة فقط من ريفاكسيل يجب أن تستخدمها في وقت واحد.** إذا قمت عن غير قصد بالاصاق أكثر من رقعة ريفاكسيل، قم بإبلاغ الطبيب فوراً.
- رقعة ريفاكسيل يمكن أيضا أن تتسبب في آثار جانبية خطيرة للمعدة، بما في ذلك الغثيان، والتقيؤ، والإسهال، والجفاف، وقلّة الشهية، وفقدان الوزن، ونزيف المعدة (القرحة). وقد يحصل جفاف نتيجة التقيؤ لفترات طويلة أو الإسهال، ويمكن أيضا أن تترافق مع نتائج خطيرة. نسبة حدوث و شدة هذه الأعراض الجانبية، ترتبط بمقدار الجرعة. لهذا السبب، يجب أن يبدأ العلاج برقعة ريفاكسيل بجرعة 4.6 ملجم / 24 ساعة ثم معايرتها للجرعة 9.5 ملجم / 24 ساعة، ثم 13.3 ملجم / 24 ساعة، إذا كان ذلك مناسباً لحالتك الصحية. **إذا توقفت عن استخدام رقعة ريفاكسيل لأكثر من 3 أيام، لا تبدأ باستخدامها مرة أخرى حتى تخبر الطبيب.**
- يكون لدى بعض الناس رد فعل تحسسي للجلد يسمى التهاب الجلد التماسي التحسسي (ACD) عند استخدام رقعة ريفاكسيل. إذا انتشر رد الفعل التحسسي خارج اطار الرقعة، وكانت الحساسية حادة، ولم تلاحظ تحسن خلال 48 ساعة من ازالة الرقعة **توقف عن استخدام رقعة ريفاكسيل** وتحدث مع طبيبك على الفور. قد تزداد حدة أعراض التهاب الجلد التماسي التحسسي لتشمل: حكة، احمرار، تورم وسخونه واحتقان في الجلد، أو تقشير أو ظهور تقرحات في الجلد قد تفرز هذه التقرحات سائل لزج او قد تكون جافة.
- وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً مع رقعة ريفاكسيل: الاكتئاب والصداع، والقلق، والدوخة، وآلام في المعدة، والتهابات المسالك البولية، وضعف العضلات، الوهن، وصعوبة في النوم.
- يجب فحص الوزن خلال استخدام المريض لرقعة ريفاكسيل. قد يحدث فقدان للوزن / فقدان الشهية. الأشخاص أقل من 50 كلغ (110 رطلا) قد يكونون أكثر عرضة لحدوث الآثار الجانبية، التي قد تكون سبباً في التوقف عن استخدام رقعة ريفاكسيل.
- يجب اخبار الطبيب قبل البدء باستخدام رقعة ريفاكسيل اذا كان المريض من الأشخاص المعرضون لقرحة المعدة أو الذين يتناولون أدوية معينة ، وذلك لأنه قد تحدث مشاكل خطيرة في المعدة، مثل النزيف.
- رقعة ريفاكسيل قد تسبب الإغماء أو بطء معدل ضربات القلب. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يجب ان يخبروا الطبيب قبل بدء العلاج. يجب استشارة الطبيب قبل استخدام رقعة ريفاكسيل عند الأشخاص المصابين بأمراض رئوية خطيرة وصعوبة في التنفس، ومشاكل في المثانة، أو التشنجات. الأعراض خارج الهرمية (على سبيل المثال، حركات الوجه أو الجسم التي لا يمكن السيطرة عليها ، بما في ذلك الرعشان والأرق) يمكن أن تحدث أو تسوء. أعراض الشلل الارتعاشي، لا سيما الرعاش، يتفاقم عند مرضى الشلل الرعاشي الذين يعانون من الخرف ويتناولون كبسولات (ريفاستيغمين).

- ينبغي أيضا للأشخاص قبل العلاج برقعة ريفاكسيل اخبار الطبيب عن أي ظروف صحية لديهم، بما في ذلك فقدان الشهية أو فقدان الوزن، أو كان لديهم رد فعل تحسسي للجلد عند الإستخدام السابق للريفاسيتيغمين (المادة الفعالة في رقعة ريفاكسيل).
- الأشخاص الذين يستخدمون رقعة ريفاكسيل و يشعرون بالدوار أو النعاس لا ينبغي لهم قيادة المركبات أو استخدام الآلات.
- أخبر الطبيب عن كل دواء يستخدمه المريض سواء كان بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.
- لا ينبغي أن تستخدم رقعة ريفاكسيل في نفس الوقت مع استخدامك لدواء "ميتوكلوبراميد" (التي تستخدم لعلاج الحرقمة، والغثيان، والقيء)، وكذلك الأدوية التي لديها تأثير مماثل على الجسم والدماغ (ممثلات محاكي الكولين) أو مع الأدوية المضادة للكولين. لا ينبغي أن تؤخذ رقعة ريفاكسيل في الأوقات نفسها التي تتناول فيها الأدوية التي تقلل ضغط الدم (حاصرات بيتا). اخبر الطبيب إذا كان المريض يحتاج لعملية جراحية تتطلب التخدير أثناء استخدامه لرقعة ريفاكسيل.
- الرجاء الإطلاع على كامل النشرة المرفقة مع هذا الدواء.

♥ يسعدنا تواصلك معنا في الجزيرة للصناعات الدوائية عند حاجتك لمزيد من المعلومات او الاستفسارات المتعلقة باستخدام هذا الدواء عن طريق احد وسائل الإتصال التالية:

فاكس: +966 11 2078097

هاتف: +966 11 2078172 تحويلة: 277

و للإبلاغ عن الآثار الجانبية المتعلقة بهذا المنتج الدوائي الرجاء التواصل مع المركز الوطني للتبقيظ والسلامة الدوائية (NPC) هاتفيا او الكترونيا عن طريق وسائل التواصل التالية:  
← في المملكة العربية السعودية

فاكس: +966-11-205-7662

للإتصال بالرقم الموحد: 19999

الرقم المجاني: 800-249-0000

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)

الموقع: [sfda.gov.sa/npc](http://sfda.gov.sa/npc)

← دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.