

# مساعدا سانوفي جيزيم المنزلي

دليل المريض للحقن المنزلي بعقار سيريزيم

إن أنشطة تقليل المخاطر هذه معتمدة من قبل الهيئة  
العامة للغذاء والدواء

الاصدار ٢ / يناير ٢٠٢١



## سيريزيم® في المنزل

دليل المرضي المصابون بمرض غوشيه والذين يتلقون سيريزيم® بالحقن في المنزل

الاصدار ٢ - يناير ٢٠٢١

### فضلا اقرأ كل هذه المعلومات بحرص قبل البدء في الحقن المنزلي.

- احتفظ بهذه المعلومات في مكان يسهل الوصول إليه ؛ قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك المعالج.
- تم وصف هذا الدواء لك .لا تعطه للآخرين حتى لو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك لأنه قد يضرهم .
- إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، يجب عليك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك إخطار طبيبك المعالج أو ممرضة الحقن.



جدول المحتويات

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ٤  | ..... مرضك، العلاج، الحقن المنزلي    |
| ٥  | ..... التنظيم                        |
| ٨  | ..... كيف اقوم بتجهيز وإعطاء سيريزيم |
| ١٣ | ..... الملحقات                       |
| ١٣ | ..... ١,١ السجل                      |



## مرضك، العلاج و الحقن بالمنزل

قررت مع طبيبك المعالج بدء العلاج بالحقن المنزلي باستخدام سيريزيم. الهدف من هذه الدليل هو تزويدك بالإرشادات حول كيفية تلقي سيريزيم في المنزل.

### مرض غوشيه وعلاجه

الأشخاص المصابون بمرض غوشيه لديهم مستويات منخفضة من إنزيم يسمى حمض بيتا جلوكوسيداز. يساعد هذا الإنزيم الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوزيل سيراميد. الجلوكوزيل سيراميد مادة طبيعية في الجسم تتكون من السكر والدهون. في مرض غوشيه ، يمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوزيل سيراميد بشكل كبير داخل خلايا معينة تسمى البلاعم. عندما يحدث هذا ، تسمى الخلايا "خلايا غوشيه". تتواجد هذه الخلايا الكبيرة بشكل رئيسي في نخاع العظام وأعضاء مثل الطحال والكبد ، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل الوظيفة مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم وتضخم الكبد والطحال وضعف العظام. تشمل الأعراض الظاهرة لمرض غوشيه ألمًا في العظام وسهولة حدوث كدمات أو نزيف. غالباً ما يتضخم الطحال والكبد.

سيريزيم هو إنزيم مصنع بالهندسة الوراثية يسمى اميجلوسيراز يمكن أن يحل محل حمض الإنزيم الطبيعي بيتا جلوكوسيداز الذي ينقص أو لا يكون نشطاً بدرجة كافية في مرضى غوشيه. يستخدم سيريزيم لعلاج المرضى الذين لديهم تشخيص مؤكد لمرض غوشيه من النوع ١ أو النوع ٣ ، والذين تظهر عليهم علامات المرض. راجع النشرة الداخلية الخاصة بسيريزيم للحصول على معلومات إضافية (انظر الملحق).

### الحقن في المنزل

حاليًا ، في بعض البلدان ، يتلقى الأشخاص الذين يعانون من مرض غوشيه والمعالجين بسيريزيم الحقن في المنزل. يجب أن تتخذ أنت وطبيبك المعالج قرار تلقي العلاج المنزلي بعد عدة أشهر من العلاج في المستشفى لضمان تحمل المريض الكافي للحقن.

يتيح لك الحقن المنزلي لسيريزيم القيام بما يلي:

- تلقي العلاج في بيئتك.
- أكثر مرونة بشأن توقيت العلاج.
- تجنب قضاء الوقت في السفر من وإلى المستشفى ودخول المستشفى.
- استمرار برنامج الدراسة العادي.
- تنظيم الأنشطة الاجتماعية والمهنية بسهولة أكبر.
- تسهيل ترتيب العلاج بين العائلة والأصدقاء.

ستقوم ممرضة الرعاية المنزلية ، مع التدريب المناسب ، بتدريبك ومساعدتك أنت و / أو مقدم الرعاية في البداية لضمان العلاج الأمثل. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل الدعم الكامل للحقن في المنزل ، فستقوم ممرضة الرعاية المنزلية بتنفيذ الإجراء بالكامل.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية من العلاج ، فعليك على الفور أن تلف انتباه طبيبك المعالج أو ممرضة الرعاية المنزلية. الآثار الجانبية الشائعة (تحدث لدى أكثر من ١ من كل ١٠٠ مريض) هي ضيق التنفس ، والسعال ، والارتيكاريا /



تورم موضعي في الجلد أو بطانة الفم أو الحلق ، والحكة ، والطفح الجلدي. شوهدت بعض الآثار الجانبية في المقام الأول أثناء إعطاء المرضى الدواء أو بعد فترة وجيزة.

وتشمل هذه الحكة ، واحمرار ، وارتيكاريا / تورم موضعي في الجلد أو بطانة الفم أو الحلق ، وعدم الراحة في الصدر ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وازرقاق الجلد ، وضيق التنفس ، والإحساس بالوخز ، وشكة ، وحرق أو تنميل في الجلد ، وانخفاض ضغط الدم وآلام الظهر. إذا كنت تعاني من آثار جانبية أثناء الحقن ، فيجب إيقاف الحقن فوراً ويجب طلب المشورة من طبيبك المعالج أو ممرضة الرعاية المنزلية. قد يلزم إجراء عمليات الحقن اللاحقة في المستشفى.

ملحوظة: يجب أن تتبع جرعة ومعدل الحقن أثناء وجودك في المنزل و الإرشادات التي قدمها طبيبك المعالج كما هو مذكور في دفتر السجل ، ولا يتم تغييرها دون موافقة الطبيب المعالج وإشراف ممرضة الرعاية المنزلية.

## التنظيم

### المريض

- يجب أن توافق أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك على تلقي العلاج في المنزل.
- يجب أن تكون البيئة المنزلية مواتية لتوفير علاج الحقن المنزلي بما في ذلك بيئة نظيفة مع الكهرباء والماء والهاتف والتبريد والمساحة لدعم تخزين سيريزيم ومستلزمات الحقن الأخرى.
- يجب أن تكون قادرًا جسديًا وعقليًا على إجراء الحقن في المنزل. الطبيب المعالج هو المسؤول عن إعطاء الإذن لتلقي حقن سيريزيم في المنزل.
- أن يكون لديك أوردة دموية يمكن الوصول إليها والتي تسمح بإدخال إبرة الحقن. عندما يكون لديك قسطرة وريدية مركزية، يجب أن تكون قادرًا على إدخال إبرة الحقن في الحاجز.
- تم إبلاغك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك من قبل الطبيب المعالج بشأن العلاج الذي سيتم تقديمه في المنزل، والمخاطر المرتبطة به ، والمضاعفات المحتملة ، وتوفير المساعدة الطبية في المنزل.
- ينبغي أن يكون لديك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك فهم لمرض غوشيه ، ويمكنك التعرف على الآثار الجانبية وفهم الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوثها.
- أن تكون تلقيت أنت و / أو مقدم الرعاية تدريباً كافياً على إجراءات تحضير سيريزيم والحقن.

### ممرضة الرعاية المنزلية

- ممرضة الرعاية المنزلية مؤهلة لإعطاء الحقن الوريدي.
- تم تدريب ممرضة الرعاية المنزلية على إعطاء سيريزيم وهي على دراية بالآثار الجانبية المحتملة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوثها.
- ستحدد ممرضة الرعاية المنزلية مع المريض و / أو مقدم الرعاية مستوى الدعم اللازم.
- سيكون لممرضة الرعاية المنزلية مهمة التنسيق مع الطبيب المعالج والمريض و / أو مقدم الرعاية في تنظيم العلاج في المنزل.



- ستتبع ممرضة الرعاية المنزلية بدقة الجرعة الموصوفة ومعدل إعطاء سيريزيم كما هو مذكور في دفتر السجل.
- ستسجل ممرضة الرعاية المنزلية كل مرة تلقي لسيريزيم في السجل.
- في حالة حدوث أثر جانبي أثناء أو بعد فترة وجيزة من الحقن (أي تفاعل مرتبط بالحقن) ، يجب على ممرضة الرعاية المنزلية/ المريض / مقدم الرعاية إيقاف الحقن والاتصال بالطبيب المعالج و / أو الاتصال برقم الطوارئ إسعاف المملكة العربية السعودية: ٩٩٧ بناء على تنسيق مع الأطباء المعالجين المذكورين في السجل

### الطبيب المعالج

- الطبيب المعالج مسؤول عن بدء جميع الإجراءات الإعطاء اللازمة ، مما يسمح لأصحاب المصلحة الآخرين (صيدلية ، ممرضة ، مريض ، مقدم رعاية) بالمتابعة.
- الطبيب المعالج هو المسؤول عن الجرعة ومعدل الحقن الموصوف في السجل. يجب إبلاغ المريض بأي تغييرات بشكل واضح ووصفها في السجل.

### الطرف الثالث / مقدم الرعاية

يفضل أن يتواجد مقدم الرعاية / الطرف الثالث أثناء الحقن في المنزل.

### السجل

- يعتبر السجل بمثابة وسيلة اتصال لجميع المشاركين في إعطاء سيريزيم في المنزل.
- يجب الاحتفاظ بدفتر السجل في منزلك ، وستقوم أنت أو مقدم الرعاية أو ممرضة الرعاية المنزلية بتحديثه.
- في السجل ، يوضح الطبيب المعالج الجرعة ومعدل الحقن وأي تغييرات.
- تسجل ممرضة الرعاية المنزلية النتائج والإجراءات من المقابلة الأولية وتدوّن أنت أو مقدم الرعاية أو ممرضة الرعاية المنزلية جميع المعلومات ذات الصلة من الزيارات اللاحقة في السجل.
- ستتبع أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك و / أو ممرضة الرعاية المنزلية بدقة الجرعة الموصوفة ومعدل حقن سيريزيم كما هو مذكور في السجل.
- ستسجل أنت و / أو مقدم الرعاية و / أو ممرضة الرعاية المنزلية كل مرة تلقي لسيريزيم في دفتر السجل.
- يجب عليك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك إحضار دفتر السجل معك إلى المستشفى في كل موعد لإجراء فحص طبي وإرجاعه إلى المنزل بعد ذلك.
- في السجل ، يصف المريض / مقدم الرعاية / ممرضة الرعاية المنزلية بوضوح الإجراءات التي تم اتخاذها في حالة حدوث آثار جانبية للحقن بناءً على نصيحة الطبيب المعالج أو ممرضة الرعاية المنزلية.



## الصيدلانية ومعدات الحقن

سيتم توفير العلاج وجميع المعدات اللازمة وفقاً للترتيبات واللوائح المحلية.

## التدريب على إعطاء سيريزيم

من حيث المبدأ ، سيتم إعطاء التعليمات الأولية في المستشفى. ستتم مناقشة مستوى الدعم المطلوب من ممرضة الرعاية المنزلية والموافقة عليه من قبلك و / أو مقدم الرعاية والطبيب المعالج.

إذا كنت تفضل الدعم الكامل لتلقي الحقن في المنزل، فستقوم ممرضة الرعاية المنزلية بتنفيذ الإجراء بأكملها نيابة عنك.

إذا كنت تفضل تنفيذ الإجراء بنفسك ، أو بمساعدة مقدم الرعاية الخاص بك ، فستتلقى أنت و / أو مقدم الرعاية تدريباً من ممرضة الرعاية المنزلية أثناء تحضير الحقن. سوف تشرح ممرضة الرعاية المنزلية وتوضح طريقة الحقن الكامل لك و / أو لمقدم الرعاية الخاص بك.

في الزيارات اللاحقة ، ستكون ممرضة الرعاية المنزلية حاضرة للمساعدة إذا لزم الأمر ، ولكنك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك سوف تنتقلان تدريجياً إلى إجراء المزيد من الإعطاء تحت إشراف ممرضة الرعاية المنزلية حتى تشعر بالثقة في إجراء الحقن بأكمله.


أثناء إعداد وحقن سيريزيم، يجب اتباع الإجراء الموضح في النشرة الداخلية .



## كيف يمكنني تحضير سيريزيم وإعطاؤه ؟

### المتطلبات

توفرها المستشفى / الصيدلية لك أو طرف ثالث بالوصفة الطبية المناسبة.



- عبوات سيريزيم ( ٤٠٠ وحدة لكل عبوة)؛ يجب تخزينها في درجة حرارة تتراوح بين ٢ الي ٨ درجات مئوية.
- الماء المعقم للحقن لإعداد حقن سيريزيم.
- محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪، ٢ × ١٠٠ مل للحقن الوريدي
- محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪، ٢ × ٥٠ مل لشطف خط الحقن قبل الحقن و بعده
- الكلورهيكسيدين ٠,٥٪ في الكحول ٧٠٪ (محلول مطهر)
- عدد مناسب من الحقن ١٠ مل و ٥٠ مل حسب جرعة سيريزيم
- ٣ إبر معقمة تحت الجلد (١,١ × ٤٠ مل)
- ١ إبرة فراشة
- مرشح ٠,٢ ميكرون منخفض الارتباط بالبروتين
- صينية إبر تحت الجلد
- شريط دقيق الثقوب
- ماسحات طبية
- سلة الأدوات الحادة
- غسول لليد
- متطلبات إضافية في حالة استخدام قسطرة وريدية مركزية
  - الهيبارين
  - إبر الهيبارين
  - حزمة غيار جروح
  - القفازات المعقمة
- أدوية الطوارئ (مضادات الهيستامين و / أو الكورتيزون).

### التجهيز

١. جهز منطقة عمل نظيفة وحدد المتطلبات.
٢. يجب إزالة عبوات سيريزيم من الثلاجة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة قبل حوالي ٣٠ دقيقة من التحضير.



٣. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الجزء السفلي من العبوة (لا تستخدم سيريزيم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية).
٤. تحقق من صحة عدد العبوات المستلمة.
٥. قم بتجهيز عدد العبوات المطلوبة فقط للحقن مرة واحدة (ملاحظة: لا يجوز تخزين سيريزيم في الشكل المحضر أو المخفف لاستخدامه لاحقاً).



### تحضير سيريزيم

١. قم بإزالة الغطاء من عبوة سيريزيم.
٢. قم بتطهير السدادة المطاطية لعبوة سيريزيم بالكحول هيكسيدين واتركه ليجف في الهواء.
٣. افتح الماء المعقم للحقن.
٤. اسحب عدد المليمترات المطلوب من الماء المعقم في السرنجة.
  - للعبوة ٤٠٠ وحدة، حضر كل عبوة ب ١٠,٢ مل من الماء المعقم للحقن؛ حجم الدواء المحضر هو ١٠,٦ مل.
٥. احقن الماء برفق في عبوة سيريزيم.
٦. كرر العملية لمزيد من عبوات سيريزيم إذا لزم الأمر.
٧. قم بفرك العبوة (الزجاجات) بلطف لخلط المحلول (تجنب الاهتزاز الشديد أثناء عملية التحضير لتجنب تكوين رغوة من المحلول).
٨. قد تظهر فقاعات صغيرة بعد الخلط.
٩. اترك المحلول يستقر لبضع دقائق للسماح لأي فقاعات موجودة بالاختفاء وللتأكد من تحضير المسحوق بشكل صحيح.
١٠. بعد التحضير، يجب فحص سيريزيم بصرياً قبل الاستخدام. نظراً لأن هذا محلول بروتيني، يحدث التندب الطفيف (الموصوف بالألياف الشفافة الرقيقة) أحياناً بعد التخفيف. يجب أن يكون المحلول المحضر سائلاً صافياً عديم اللون وخالياً من المواد الغريبة.
١١. إذا لاحظت وجود مواد غريبة أو تغير لون السائل، فلا تستخدم المنتج واتصل بمرضة الرعاية المنزلية.

### التخفيف

١. طهر غطاء / فتحة كيس أو كيسين من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ ٪ باستخدام الكلور هيكسيدين واتركه يجف في الهواء.
٢. احسب كمية محلول سيريزيم المحضرة الموجودة في العبوات واسحب نفس الكمية من كيس محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ ٪، وبالتالي يتم خلق مساحة كافية لإضافة محلول سيريزيم المحضر. على سبيل المثال، إذا كانت الكمية الموصوفة هي ٣ عبوات من سيريزيم كل منها ٤٠٠ وحدة، قم بإزالة ٣٠ مل (= ١٠×٣ مل) من محلول كلوريد الصوديوم من كيس محلول كلوريد الصوديوم. لا تقم مطلقاً بإزالة أكثر

من نصف محتوى كيس كلوريد الصوديوم لضمان أن نصف المحلول المخفف على الأقل يتكون من كلوريد الصوديوم.



٣. باستخدام واحدة أو أكثر من السرنجات ٥٠ مل ، اسحب ١٠ مل لعبوة ٤٠٠ وحدة لتقليل عدد العمليات . في اللحظة التي يتم فيها سحب هذه الكميات يجب ألا يحتوي الدواء المحضر على أي رغوة.
٤. ثم قم بحقن الحجم الكلي لمحلول سيريزيم المحضر برفق في كيس محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪.
٥. اخلط محلول سيريزيم هذا بعناية.
٦. يجب ترشيح المحلول المخفف من خلال مرشح ٠,٢ ميكرون أثناء الإعطاء.

### ملء خط الحقن

١. أزل جهاز الحقن من العبوة وأغلقه باستخدام المشبك الأسطواني.
٢. قم بتوصيل الشوكة في كيس محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪ واملأ جهاز الحقن عن طريق الضغط على حجرة التنقيط رأساً على عقب وفتح المشبك.
٣. املأ النظام بالكامل ، و قم بإزالة أي فقاعات هواء قد تكون موجودة وأغلق المشبك الأسطواني.
٤. قم بتوصيل كيس الحقن الذي يحتوي على سيريزيم بجهاز Y.

### ادخال الإبرة في الوريد

١. تأكد من أن بعض شرائح الشريط اللاصق معلقة جاهزة للاستخدام وأن بدء نظام الحقن في متناول اليد. ضع محلول الكلور هيكسيدين بالقرب منك مع بعض الشاش.
٢. قم بإزالة الإبرة من العبوة.
٣. اجلس وأرح أحد أذرعك على المنضدة (يفضل على قطعة قماش نظيفة).
٤. ضع العاصبة ، و ابحث عن الوريد المناسب ، و عقم المنطقة التي سيتم إدخال الإبرة فيها و اتركها حتى تجف.
٥. اسحب الجلد بقوة وأدخل الإبرة (بحيث تكون عينه متجهة لأعلى) بزاوية طفيفة عبر الجلد وفي الوريد. عندما تدخل الإبرة في الوريد ، سيظهر "تدفق" من الدم في بداية الأنبوب.
٦. أدخل الإبرة في الوريد بحوالي ٠,٥ سم لضمان عدم خروجها على الفور مرة أخرى. استخدم شريطاً لاصقاً لتثبيت الإبرة في مكانها. قم بتوصيل الجهاز المزود بفلتر بالإبرة.
٧. ازل العاصبة. سوف يمتلئ الأنبوب بالدم الآن. إذا لم يحدث ذلك ، فإن الإبرة غير موضوعة بشكل صحيح في الوريد. يجب بعد ذلك تكرار العملية باستخدام إبرة جديدة.
٨. قم بتوصيل كيس الحقن المحضر بحامل التنقيط و افتح الصمام. اجلس واسترخي أثناء إجراء الحقن.

## الإعطاء



يجب أن يعطي المحلول المحضر كما هو موصوف خلال ٣ ساعات من تحضيره. سيحتفظ المنتج المخفف في محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪ بالثبات الكيميائي لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة إذا تم تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين ٢ إلى ٨ درجات مئوية بعيداً عن الضوء.

سيحدد الطبيب المعالج جرعة سيريزيم ومعدل الحقن وأي تغييرات.

بعد اكتمال حقن سيريزيم، يتم شطف النظام بمحلول كلوريد الصوديوم ٠,٩٪ بنفس المعدل ويتم إزالة الإبرة.

## في حالة وجود قسطرة وريدية مركزية

عندما تثبت قسطرة وريدية مركزية لحقن سيريزيم ، سيتم إطلاعك أنت و / أو مقدم الرعاية الخاص بك على كيفية العناية بالجهاز .

تتضمن الرعاية المنزلية المناسبة للقسطرة الوريدية المركزية رياً منتظماً باستخدام عقار يسمى الهيبارين لمنع التخثر والاهتمام بإجراءات التعقيم للحفاظ على الجهاز خالياً من الميكروبات المعدية. الخطوات التالية ضرورية:

- عند الاستخدام ، قم بتغطية الموقع بضمادة انسداد شفافة. لا حاجة للتضميد عند عدم الاستخدام.
- اغسل بمحلول ملحي ٥ مل قبل وبعد كل استخدام.
- اغسل ب ٥ مل من الهيبارين ( ١٠٠ وحدة / مل) بعد كل استخدام.

## تقييمات السلامة

في حالة حدوث آثار جانبية أثناء التسريب، أو إذا شعرت بتوسعك أثناء تناول العلاج أو بعد العلاج، اتصل بمرمضة الرعاية المنزلية أو الطبيب المعالج على الفور. الآثار الجانبية الشائعة (تحدث في أكثر من ١ من كل ١٠٠ مريض) هي ضيق التنفس، والسعال، وقشعريرة /التورم الموضعي في الجلد أو بطانة الفم أو الحلق، والحكة و طفح جلدي. ولوحظت بعض الآثار الجانبية بشكل رئيسي أثناء إعطاء المرضى الدواء أو بعده بوقت قصير. وهذه تشمل الحكة، قشعريرة /تورم في الجلد أو بطانة الفم أو الحلق، الوخز أو التئيميل أو الحرق أو خدر الجلد، انخفاض في ضغط الدم، زيادة معدل ضربات القلب وآلام الظهر . اذا عانيت من آثار جانبية أثناء الحقن ، يجب إيقاف الحقن فوراً و يجب طلب المشورة من طبيبك المعالج أو ممرضة الرعاية المنزلية الخاصة بك. أي آثار جانبية يجب أيضاً أن يتم تسجيلها في السجل.

في حالة حدوث آثار جانبية خطيرة أثناء أو بعد فترة وجيزة من الحقن والتي تتطلب فورا الانتباه / التدخل ، اتصل برقم الطوارئ الخاص بالإسعاف في المملكة العربية السعودية: ٩٩٧ (انظر السجل).

### خطأ في التحضير / الإعطاء

إذا علمت أنه قد تم ارتكاب خطأ أثناء تحضير و / أو إعطاء الدواء يرجى الاتصال بممرضة الرعاية المنزلية أو الطبيب المعالج.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتيفظ والسلامة الدوائية

– فاكس +٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

– الاتصال بالمركز الوطني للتيفظ والسلامة الدوائية "NPC": ١٩٩٩٩

– البريد الإلكتروني: [npc.drug@sFDA.gov.sa](mailto:npc.drug@sFDA.gov.sa)

– الموقع الإلكتروني: <https://ade.sFDA.gov.sa>

شركة سانوفي السعودية

– التيفظ الدوائي، فضلا الاتصال علي: + ٩٦٦٥٤٤٢٨٤٧٩٧

– البريد الإلكتروني: [ksa\\_pharmacovigilance@sanofi.com](mailto:ksa_pharmacovigilance@sanofi.com)

#### هذا المستحضر هو دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وتناوله خلا فًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرفها.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك بنفسك.
- لا تكرر العلاج بدون استشارة الطبيب.
- احفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب  
اتحاد الصيادلة العرب



## الملحقات

١,١ السجل



سجل سيريزيم للحقن المنزلي

بيانات عامة

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
|  | المريض             | الاسم    |
|  |                    | العنوان  |
|  |                    | المدينة  |
|  |                    | الهاتف   |
|  | الممرضة            | الاسم    |
|  |                    | المنظمة  |
|  |                    | الهاتف   |
|  | الطبيب المعالج     | الاسم    |
|  |                    | المستشفى |
|  |                    | العنوان  |
|  |                    | المدينة  |
|  |                    | الهاتف   |
|  | الصيدلية           | الاسم    |
|  |                    | العنوان  |
|  |                    | المدينة  |
|  |                    | الهاتف   |
|  | رقم الطوارئ الوطني | ٩٩٧      |

بيانات الإعطاء ( تستكمل بمعرفة الطبيب المعالج )

|                 |  |
|-----------------|--|
| يوم - شهر - سنة | تلقي سيريزيم منذ                                   |
|                 | المرّة الاولى للحقن المنزلي                        |
|                 | سبب الحقن المنزلي لسيريزيم                         |
|                 | من فضلك أشر إلي الدعم المراد تقديمه بواسطة الممرضة |
|                 | نظام جرعات سيريزيم ( الجرعة، التكرار، معدل الحقن ) |

تفاصيل علاج الطوارئ ( تستكمل بمعرفة الطبيب المعالج )

|   |
|---|
| <p>إجراءات ضرورية يجب اتخاذها في حالة حدوث تفاعلات مرتبطة بالحقن:</p> <p>١. إيقاف الحقن</p> <p>٢. اتصل برقم طوارئ الاسعاف الخاص بالمملكة العربية السعودية: ٩٩٧</p> <p>٣. اتصل بالطبيب</p> |
|---|



بيانات الحقن (يتم استكمالها من قبل ممرضة الرعاية المنزلية و / أو المريض و / أو مقدم الرعاية )

|                           |  |
|---------------------------|--|
| التاريخ (يوم - شهر - سنة) | تاريخ الحقن  |
|                           | الصحة العامة للمريض: مشاكل صحية معينة / علامات هامة      |
|                           | جرعة الحقن   |
| عبوة ٤٠٠ وحدة _____       | عدد العبوات المستخدمة                                    |
|                           | مدة التلقي   |
|                           | معدل التلقي  |
|                           | مشاكل / علامات هامة (مرتبطة بالحقن مثل الأعراض الجانبية) |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| التاريخ (يوم - شهر - سنة) | تاريخ الحقن  |
|                           | الصحة العامة للمريض: مشاكل صحية معينة / علامات هامة      |
|                           | جرعة الحقن   |
| عبوة ٤٠٠ وحدة _____       | عدد العبوات المستخدمة                                    |
|                           | مدة التلقي   |
|                           | معدل التلقي  |
|                           | مشاكل / علامات هامة (مرتبطة بالحقن مثل الأعراض الجانبية) |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| التاريخ (يوم - شهر - سنة) | تاريخ الحقن  |
|                           | الصحة العامة للمريض: مشاكل صحية معينة / علامات هامة      |
|                           | جرعة الحقن   |
| عبوة ٤٠٠ وحدة _____       | عدد العبوات المستخدمة                                    |
|                           | مدة التلقي   |
|                           | معدل التلقي  |
|                           | مشاكل / علامات هامة (مرتبطة بالحقن مثل الأعراض الجانبية) |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| التاريخ ( يوم - شهر - سنة ) | تاريخ الحقن   |
|                             | الصحة العامة للمريض: مشاكل صحية<br>معينة / علامات<br>هامية  |
|                             | جرعة الحقن  |
| عبوة ٤٠٠ وحدة               | عدد العبوات المستخدمة                                       |
|                             | مدة التلقي  |
|                             | معدل التلقي   |
|                             | مشاكل / علامات هامة (مرتبطة بالحقن<br>مثل الأعراض الجانبية) |

للمعلومات الطبية: الرجاء التواصل علي +٩٦٦١٢٦٦٩٣٣١٨  
أو البريد الالكتروني: [ksa.medicalinformation@sanofi.com](mailto:ksa.medicalinformation@sanofi.com)

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

المركز الوطني للتيفظ والسلامة الدوائية

- فاكس +٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

- الاتصال بالمركز الوطني للتيفظ والسلامة الدوائية "NPC": ١٩٩٩٩

- البريد الالكتروني: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)

- الموقع الالكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>

شركة سانوفي السعودية

- التيفظ الدوائي، فضلا الاتصال علي: +٩٦٦٥٤٤٢٨٤٧٩٧

- البريد الالكتروني: [ksa\\_pharmacovigilance@sanofi.com](mailto:ksa_pharmacovigilance@sanofi.com)

للحصول علي نسخ اضافية الرجاء الاتصال على سانوفي +٩٦٦٥٦٤٠٩٥٢٠٧

