

### دواعى استعماله:

يحتوى **فاركولين محلول تنفس** على عقار يسمى سالبوتامول والذى ينتمى الى مجموعة من الدواء تعرف بإسم موسعات الشعب الهوائية سريعة المفعول

تساعد موسعات الشعب الهوائية على استمرار فتح الرئتين مما يسهل دخول وخروج الهواء.

وهى تساعد على تخفيف ضيق الصدر والصفير عند التنفس والسعال.

يستعمل **فاركولين محلول تنفس** فعلاج اضطرابات التنفس فى مرضى الربو وغيرها من أمراض الصدر. وعادة يعطى للأشخاص الذين يعانون بشدة من هذه الحالات عندما لا تساعد الأشكال الأخرى من العلاج بدرجة كافية. **فاركولين محلول تنفس** يستعمل أيضا لعلاج أزمات الربو الشديدة. يستعمل **فاركولين محلول تنفس** فقط من خلال جهاز الاستنشاق ولايستعمل بالحقن أو البلع.

### الجرعة:

#### التعاطى المتقطع:

الكبار والمراهقين ١٢ سنة وأكثر: الجرعة المعتادة ٠,٥ مليلتر (= ١٥ قطرة) الى ١ مليلتر (= ٣٠ قطرة) من **فاركولين محلول تنفسى** (٢,٥ الى ٥ مجم سالبوتامول) قد يحتاج بعض المرضى الى ٢ مليلتر (= ٦٠ قطرة) (١٠ مجم سالبوتامول) الأطفال من عمر ١٨ شهر الى ١٢ عام الجرعة المعتادة هى ٠,٥ مليلتر (= ١٥ قطرة) الى ١ مليلتر (= ٣٠ قطرة) (٢,٥ الى ٥ مجم سالبوتامول) من

**فاركولين محلول تنفس** تعطى ٤ مرات يوميا.

قد يوصيك الطبيب بتخفيف **فاركولين محلول تنفس** بمحلول ملح معقم قبل وضعه فى جهاز الاستنشاق. تذكر اتباع تعليمات التخفيف.

#### التعاطى المستمر:

معدل التعاطى المعتاد هو ١ الى ٢ مجم سالبوتامول كل ساعة.

يمكن الحصول على هذه الجرعة بتخفيف ١ مليلتر (= ٣٠ قطرة) أو ٢ مليلتر (= ٦٠ قطرة) من **فاركولين محلول تنفسى** الى ١٠٠ مليلتر بمحلول ملحى معقم للحصول على محلول يحتوى على ٥٠ الى ١٠٠ ميكروجرام/مليلتر من السالبوتامول، واستنشاق الرذاذ من خلال جهاز استنشاق مناسب

تاريخ الإصدار: ٢٠١٦/٦/٦

## كيفية إستخدام فاركولين محلول تنفس

### إرشادات وإحتياجات خاصة بالإستعمال:

- 1- يجب استعمال فاركولين محلول تنفس بالطريقة الصحيحة للتأكد من الحصول على أقصى فائدة من الدواء. فاركولين يجب ان يستخدم فقط عن طريق الاستنشاق فقط وليس عن طريق الحقن او البلع
- 2- تأكد من كيفية، وقت إستخدام العلاج، وكمية المحلول الذى يجب استعماله اتبع تعليمات الطبيب بدقة. إذا كان لديك إستفسار استشر الطبيب .
- 3- لتجنب التلوث الميكروبي، يجب مراعاة التنظيف والتجفيف الجيد بعد كل استخدام لأجزاء جهاز الإستنشاق.
- 4- ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة طرف عبوة المستحضر مع أي سطح، بالإضافة إلى ذلك، إذا
- 5- تغير لون المحلول أو أصبح غائماً، فإنه لا ينبغي استخدامه.
- 6- لا ينبغي أن تكون أجهزة الإستنشاق مشتركة بين المرضى.

### طريقة إستعمال جهاز الإستنشاق.


- 1- جهاز جهاز الإستنشاق للملأ كما هو موضح بالشكل (رقم ١) .



شكل (١)

تاريخ الإصدار: ٢٠١٦/٦/٦

2- قم بوضع الكمية الموصى بها بمعرفة الطبيب ( ١ مليلتر = ٣٠ قطرة).ضع الكمية فى وعاء الإستنشاق عن طريق الفتحة الموضحة بالجهاز.



شكل (2)

وعاء جهاز الإستنشاق

2- قم بوضع الكمية الموصى بها بمعرفة الطبيب ( ١ مليلتر = ٣٠ قطرة).ضع الكمية فى وعاء الإستنشاق عن طريق الفتحة الموضحة بالجهاز.

**ملحوظة:** اغلق الزجاجاة بمجرد أخذ المحلول. احتفظ بالزجاجاة مغلقة طول الوقت ولا تفتحها بدون استخدام.

تاريخ الإصدار: ٢٠١٦/٦/٦





للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني للتبقيظ و السلامة الدوائية  
فاكس: +966-1-210-7398  
الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠  
الرقم الموحد: ١٩٩٩٩  
البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfd.a.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.a.gov.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.sfd.a.gov.sa/npc](http://www.sfd.a.gov.sa/npc)

او

مالك رخصة التسويق :  
مؤسسة زمو التجارية  
ص.ب: ٢٤٠٨  
الرمز البريدي: ١١٤٥١  
العنوان: حى المربع مدينة الرياض  
تليفون: 00966-1-4021068 EXT 102  
الفاكس: 00966-1-4021986  
الايمل: [Rami.kabar@zimmo.net](mailto:Rami.kabar@zimmo.net)

تاريخ الإصدار: ٢٠١٦/٦/٦