

مذكرة الدواء الخاصة للمرضى الذين يتلقون عقار مضاد لمستقبل عامل نمو البشرة إربيتوكس (سيتوكسيماب)

للمرضى الذين تم وصف إربيتوكس
(سيتوكسيماب) لهم كمضاد لمستقبلات
عامل نمو البشرة.

من أجل ضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء والتعامل
المناسب مع التأثيرات السلبية، ينصح بقراءة معلومات
الوصفة الطبية بعناية قبل استخدام الدواء.
تمت مراجعة هذه الوثيقة والموافقة عليها من قبل الهيئة
العامة للغذاء والدواء (SFDA).

ميرك



أتمنى أن أملك طريقة لتتبع حالة السرطان لدي

ليس هناك أداة عملية وذات نفع تتمناها أفضل من مفكرة العلاج الخاصة بتناول دواء إربيتوكس (سيتوكسيماب). فهي يمكن أن تساعدك بسهولة على تتبع حقن إربيتوكس (سيتوكسيماب)، إضافة إلى أعراض مرضك. قبل أن تبدأ، أكمل القسم الذي يتضمن معلوماتك الشخصية، والاتصال في حالات الطوارئ ومعلوماتك الطبية، وراعِ الدقة نظرًا لأهميتها.

هذه المفكرة معدة للمرضى الذين قد وُصف لهم دواء إربيتوكس (سيتوكسيماب).

تذكر



تختلف الآثار الجانبية والأعراض من شخص لآخر. يجب أن تتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى/ غرفة طوارئ إذا عانيت من أي عرض / أثر غير عادي شديد أو كان لديك أي استفسار عاجل يتعذر معه الانتظار حتى يوم العمل التالي.

تتبع الجرعات / الحقن



بمجرد أن تبدأ رحلتك العلاجية باستخدام إريبتوكس (سيتوكسيماب)، دوّن تاريخ الحقن/ جدول الجرعات كل أسبوعين ووقته في المفكرة. هناك مساحة كافية لكي تدوّن فيها المعلومات/ الملاحظات الخاصة بالحقن.

تسجيل الأعراض والأسئلة



في مفكرة العلاج، قد ترغب في:

تدوين ما تشعر به كل يوم بما في ذلك تفاصيل عن صحتك العامة، وأعراضك، وأي آثار غير مرغوبة (مثل ردود الفعل الجلدية) التي قد تعاني منها في حالة استخدام إريبتوكس (سيتوكسيماب).



دوّن أي أسئلة ترغب في سؤال طبيبك عنها.



دوّن مواعيدك مثل الزيارات الطبية، والاختبارات/ الفحوص القادمة، ومكالماتك مع الاختصاصي المعالج أو الممرضة.



راجع مفكرة العلاج الخاصة بك قبل كل زيارة من زيارتك الطبية. فمن السهل أن تنسى التفاصيل أثناء الانتظار في عيادة الطبيب. ولكن تتبع أعراضك وتقديمك يمكن أن يساعدك أنت وطبيبك على التعامل مع أعراضك.



ملحوظة



قد يتسبب دواء إريبتوكس (سيتوكسيماب)، مثل غيره من العلاجات الأخرى التي تعالج سرطان القولون والمستقيم/ سرطان القولون والمستقيم النقيلي/سرطان الرأس والعنق، في آثار غير مرغوبة. عند بدء تناول دواء إريبتوكس (سيتوكسيماب)، يجب أن تتحدث مع طبيبك عن الفوائد المحتملة لدواء إريبتوكس (سيتوكسيماب) واثاره الجانبية المحتملة لتقرر كيفية التعامل معها وتحسين جودة حياتك.

يرجى الاطلاع على دليل دواء إريبتوكس (سيتوكسيماب) المرفق ومعلومات الوصفة الطبية في مجموعة الأدوات هذه والتحدث مع طبيبك للمزيد من المعلومات.

أداة تتبع الأعراض

من المهم تذكر أن المشكلات الجلدية أصد الآثار الجانبية لدواء إريبتوكس (سيتوكسيماب). تتضمن المشكلات الجلدية الطفح الجلدي الشبيه بحب الشباب، وجفاف الجلد وتشققه، والالتهابات، ونمو الشعر بشكل غير طبيعي. قد يتورم الجلد المحيط بأظافر أصابع اليد والقدم. وقد تمثّل بثور الجلد أو الأغشية المخاطية (مثل الفم) أو تقشير الجلد أعراضاً لتفاعلات خطيرة، وقد يحدث لديك أيضاً تغيرات في الشعر والأظافر.¹

المعلومات العامة

الاسم

العنوان

الرمز البريدي للمدينة

الهاتف

جهة الاتصال في حالات الطوارئ

الاسم

العنوان

الرمز البريدي للمدينة

الهاتف

المعلومات الطبية

اسم الطبيب

هاتف الطبيب

اسم الممرضة

هاتف الممرضة

الحساسيات

إذا كانت لديك أي أسئلة عن علاجك، فاتصل بالاختصاصي المعالج/ الممرضة.

Ref 1. NCCN Task Force Report: Management of Dermatologic and Other Toxicities Associated With EGFR Inhibition in Patients With Cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Vol 7 Supplement 1. 2009 http://www.jnccn.org/content/7/Suppl_1/S-5.abstract. Boone SL, Rademaker A, Liu D, et al. Impact and management of skin toxicity associated with anti-epidermal growth factor receptor therapy: survey results. Oncology 2007; 72: 152-159. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18160805>. www.fightcancer.org/Resources.



ما العلامات التي قد تظهر على جسمك من جهتيه الأمامية والخلفية؟¹⁻³

ما العلامات التي قد تظهر في الجهة الخلفية لجسمك؟¹⁻³

الشعر

تغيرات في الشعر مثل بقاء نمو الشعر أو الصلع. يمكن حدوث الصلع بعد ٢-٣ أشهر من العلاج. يحدث نمو زائد في شعر الوجه وفي انتفاء الرموش بعد شهر إلى شهرين من العلاج. قد يظهر طفح جلدي شبيه بحب الشباب على فروة الرأس أيضا.

الظهر

قد يظهر طفح جلدي أحمر ومؤلم ومؤثر للحكة في الجزء السفلي للظهر. وقد تعاني من الجفاف والتقشر في هذه المناطق.

مفاصل أصابع اليدين


ابحث عن أي شقوق مؤلمة في الجلد فوق مفاصل أصابع اليدين.

الأطراف

إذا كنت تعاني من طفح جلدي شبيه بحب الشباب، فقد تعاني أيضا من الحكة الجلدية وجفاف الجلد وتقشره على الذراعين والساقين في هذه المناطق.

القدمين

قد تظهر تشققات مؤلمة في الكعبين وباطن القدمين. وهي تظهر عادة بعد شهر إلى شهرين تقريبا من العلاج. توجد فرصة للعدوى في هذه المناطق.



ما العلامات التي قد تظهر في الجهة الأمامية لجسمك؟¹⁻³

الوجه

راقب ظهور الطفح الجلدي الشبيه بحب الشباب. قد يكون هذا مؤلما ومثيرا للحكة. قد ينطوي الطفح الجلدي على جزء صغير من الجسم (الطفح الجلدي الخفيف) أو جزء كبير من الجسم (الطفح الجلدي الشديد). ويظهر هذا الطفح بعد العلاج بحوالي ٨-١٠ أيام.

الصدر


راقب ظهور الطفح الجلدي الشبيه بحب الشباب. قد يظهر الطفح الجلدي الأحمر، والمثير للحكة والمؤلم في الجزء العلوي للصدر بعد العلاج بأيام، أي بعد العلاج بحوالي ٨-١٠ أيام.

اليدين

ابحث عن شقوق مؤلمة في راحة اليد وأطراف الأصابع. قد يتضمن هذا جفاف الجلد وتقشره.

أظافر اليدين والقدمين

ابحث عن أي تورم مؤلم (التهاب) يحتوي على صديد حول أظافر اليدين والقدمين. ويلاحظ هذا عادة في الأصابع الأولى، ويحدث بعد العلاج لمدة شهرين أو أكثر. قد يلاحظ تشقق الأظافر أو تخططها.



الأسبوع ١

التاريخ _____

الأعراض _____

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت

الأسبوع ٢

التاريخ _____

الأعراض _____

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت

الأسبوع ٣

التاريخ _____

الأعراض _____

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت

الأسبوع ٤

التاريخ _____

الأعراض _____

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت

ملحوظة: يرجى الاطلاع على دليل دواء إريبتوكس (سيتوكسيماب) ومعلومات الوصفة الطبية الموجودة داخل علبة الدواء والتحدث مع طبيبك التزاماً بالمرشد من المعلومات.



يرجى الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها مرتبطة باستخدام الدواء الخاص بك إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) وإلى وزارة الصحة.

المركز الوطني للتبليغ الدوائي، (NPC)
هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)
مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA): ١٩٩٩٩
فاكس: +٩٦٦١١ ٢٠٥٧٦٦٢
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني: http://ade.sfda.gov.sa

إخلاء المسؤولية: لا تُستخدم هذه المواد إلا لغرض تعقيم اختصاصي الرعاية الصحية وتدريبهم. يتحمل اختصاصي الرعاية الصحية وحده مسؤولية أي شكل آخر من أشكال توزيع هذه المواد، دون أي مسؤولية على شركة ميرك سيرونو الشرق الأوسط منطقة حرة محدودة. إذا كنت مريضاً، فيرجى الرجوع إلى اختصاصي الرعاية الصحية المعالج كلما عانيت من أي إصابة أو أثر ضار أو كانت لديك أي شكوى بشأن حالتك الصحية أو دوائك.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال باختصاصي الأورام المعالج لك أو:
بشركة ميرك سيرونو ميدل إيست منطقة حرة ليمتد.
منطقة الصالحية، بناية الصفوة - الطابق الثاني، بوابه رقم ٤، مكتب ٤٠٨،
الرياض - المملكة العربية السعودية. ت: +٩٦٦١١ ٢٨٨ ٦٧٥٠، ف: +٩٦٦١١ ٢٨٨ ٦٧٠
البريد الإلكتروني: drug.safety.saudi@merckgroup.com

SA-ERB-00006