

دليل الحقن

مُعَدُّ لِوالدي المَرْضى الرَّضَّع
أو مُقَدِّمِي الرُّعايَة الصَّحيَّة



سترينسٽ®

محلول للحقن . ٤ ملخ/ مل

٤ ملخ / ١ مل ٢٨ ملخ / ٧ . مل ١٨ ملخ / ٤٥ . مل

محلول للحقن . ١ ملخ/ مل

٨ ملخ / . مل

أسفوتيز ألفا

يُخضع هذا المنتج الطبي لمراقبة إضافية ▼

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبيظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

لقد أُعدَّ هذا الدليل ”دليل الحقن“ من أجل والذي المرضى الرّضع و مقدمي الرعاية الصحية لهم، المُصابين بتنفسُ الفُسفاتاز المبتدئ من عمر الطفولة ، والذين قد يستفيدون من العلاج التعويضي بالإِنزيمات على المدى الطويل، وقد وُصف لهم العلاج بدواء أسفوتينز أَلفا

يُقدّم هذا الدليل إرشادات تفصيليّة مصحوبة برسومات واضحة حول كيفية اختيار موضع الحقن، وكيفية تنفيذ وتسجيل حقن رضيعك أو طفلك.

أُعدَّ هذا الدليل كوثيقة داعمة للتدريب الذي قدّمه لك مقدم الرعاية الصحيّة الخاص بطفلك.

إذا كان لديك أي سؤال فيرجح الاتصال بمقدم الرعاية الصحيّة الخاص بطفلك.

المحتويات

| | |
|----|--|
| ٤ | معلومات مهمة |
| ٥ | تحذيرات |
| ٦ | ما هو أسفوتيز ألفا |
| ٧ | كيف أبدأ في علاج رضيعي أو طفلي باستخدام أسفوتيز ألفا |
| ٨ | ما الجرعة التي يجب استخدامها من أسفوتيز ألفا |
| ٩ | كيف يتم إعطاء أسفوتيز ألفا |
| ١٤ | كيفية حقن سترينسيك® (أسفوتيز ألفا) |
| ١٥ | تخزين سترينسيك® (أسفوتيز ألفا) والسفر أثناء استخدامه |
| | جهات الاتصال المحلية |

لا تحقن رضيعك أو طفلك بأسفوتيز ألفا حتى تحصل على التدريب المناسب من قبل مقدم الرعاية الصحية.

- قبل أن تبدأ تحقق من تاريخ صلاحية أسفوتيز ألفا. لا تستخدمه إذا كانت صلاحيته مُنتهية.
- استخدم دائمًا قارورة جديدة وافحص السائل بعناية؛ حيث يجب أن يبدو شفافًاً وعديم اللون مائلًا للأصفر قليلاً، وقد يحتوي على عدد قليل من الجسيمات الصغيرة الشفافة أو البيضاء. لا تستخدم الدواء إذا تغير لون السائل أو إذا احتوى على أي كتل أو جزيئات كبيرة، واستبدلها بقارورة جديدة.
- إذا كنت تشك في أن السائل الموجود في القارورة ملوث فلا تقم باستخدامه، واختر قارورة أخرى، وأصلب بمقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك لطلب المشورة.
- استخدم الجرعة المحددة دائمًا (وفقاً لعدد المليغرامات) التي وصفها الطبيب المعالج لطفلك.
- القوارير معدّة للاستخدام مرة واحدة فقط، ويجب ألا يتم ثقبها إلا مرة واحدة؛ وتخلص منها بأمان.
- تستخدم الحقن والإبر مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها بحذر؛ احفظها بعيداً عن متناول الأطفال، وتخلص منها بأمان في حاوية خاصة بالأدوات الحادة؛ يجب عدم خلط الإبر والمحاقن بالقمامة المنزلية العادية.
- تحفظ قوارير أسفوتيز ألفا في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح ما بين ٢ و ٨ درجة مئوية. لا تضع أسفوتيز ألفا في الفريزر أو بالقرب منها؛ لا تقم أبداً بحقن أسفوتيز ألفا الذي تم تجميده من قبل أو تشك في تعرّضه للتجمد.
- احفظ أسفوتيز ألفا الخاص بطفلك في العبوة الأصلية من أجل حماية الدواء من الضوء.

للحصول على المزيد من المعلومات حول أسفوتيز ألفا يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض التي يمكنك العثور عليها في عبوة سترينسيك®

⚠ تحذيرات واحتياطات

- بعض المرضى الذين يتلقون العلاج بأسفوتizer ألفا قد تظهر لديهم ردود فعل تحسسية مهدّدة للحياة تُشبه الحساسية المُفرطة التي تحتاج إلى علاج طبي. وقد تظهر لدى المرضى الذين يشعرون بالأعراض المشابهة للحساسية المُفرطة التالية (صعوبة التنفس، الشعور بالاختناق، الغثيان، تورّم حول العينين، وأوّل دوار). وقد يحدث رد الفعل التحسسي لدى المرضى خلال دقائق بعد الحقن بأسفوتizer ألفا، ويمكن أن يحدث ذلك للمرضى الذين كانوا يتلقون أسفوتizer ألفا لأيّ فترة زمنية (على سبيل المثال: أكثر من عام واحد). إذا شعر رضيعك أو طفلك بأيّ من تلك الأعراض فأوقف العلاج بأسفوتizer ألفا واطلب المساعدة الطبية على الفور.
- إذا تعرّض رضيعك أو طفلك لرّد فعل تحسسيّ أو لحالة ذات أعراض مشابهة: سيقوم الطبيب المعالج له بمناقشة الخطوات التالية معك، وقد يقوم باستئناف العلاج بأسفوتizer ألفا تحت الإشراف الطبي. احرص على اتباع التعليمات الصادرة من الطبيب المعالج لطفلك.
- من المهم تغيير موضع الحقن من بين المواقع التالية للحد من خطر الإصابة بالحثل الشحمي: الأرداف، أو البطن، أو الفخذ، أو الذراعين (العضلات الدالية). تم الإبلاغ عن وجود كتل دهنية أو نقص في الأنسجة الدهنية على سطح الجلد (الحثل الشحمي الموضعي) في موضع الحقن بعد عدة أشهر في المرضى الذين يستخدمون دواء أسفوتizer ألفا. راجع قسم "كيف يتم إعطاء أسفوتizer ألفا؟" بعناية لمعرفة توصيات الحقن.
- إذا تم علاج رضيعك أو طفلك بدواء أسفوتizer ألفا ، فقد يتعرض إلى رد فعل في موضع الحقن على سبيل المثال: (الم، عقيادات، طفح، تصبّغ) أثناء حقن الدواء أو خلال الساعات التالية للحقن. إذا واجهت أيّ رد فعل شديد في موضع الحقن، فقم بإبلاغ الطبيب المعالج لطفلك على الفور.

ما هو أسفوتيز ألفا ؟

أسفوتيز ألفا هو دواء مُصمم كعلاج توعيسيٌّ بالإِنزيمات على المدى الطويل للمرضى المصابين بنقص الفسفاتاز المبتدئ من عمر الطفولة ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن تحت الجلد.

كيف أبدأ في علاج رضيعي أو طفلي باستخدام أسفوتيز ألفا ؟

ينبغي أن يوصي أسفوتيز ألفا من قبل الطبيب المعالج لرضيعك أو طفلك. سوف يُقدم لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك نصيحة حول مجموعة من المواد التثقيفية المُتاحة لمساعدتك في العلاج. يمكن أن يساعدك دليل الحقن هذا عند تعلم كيفية حقن رضيعك أو طفلك.

ما الجرعة التي يجب استخدامها من أسفوتيز ألفا ؟

بمجرد أن يصف الطبيب أسفوتيز ألفا لرضيعك أو طفلك سوف تحتاج إلى إعطاء الدواء وفقاً للجرعة المحددة (بحسب عدد المليغرامات) التي وصفها الطبيب المعالج لطفلك.

تعتمد الجرعة التي يصفها الطبيب على وزن رضيعك أو طفلك. يقوم الطبيب المعالج لطفلك باحتساب الجرعة الصحيحة ويتكون من كمية إجمالية قدرها ٦ ملغرام/ كلغ من وزن الجسم من أسفوتيز ألفا أسبوعياً، يتم إعطاؤها عن طريق الحقن تحت الجلد. قد يتلقى طفالك إما حقنة ١ ملغرام/ كلغ من أسفوتيز ألفا ست مرات أسبوعياً أو حقنة ٢ ملغرام/ كلغ من أسفوتيز ألفا ثلاثة مرات أسبوعياً بناء على توصية من الطبيب المعالج لطفلك.

على سبيل المثال: إذا كان وزن رضيعك أو طفلك ٦ كلغ؛ فسوف يتلقى ٦ ملغرام ست مرات أسبوعياً، أو ١٢ ملغرام ثلاثة مرات أسبوعياً. يجب ألا يتجاوز العدد الأقصى لكمية الدواء في كل حقنة ١ مل. إذا كانت الكمية المطلوبة أكثر من ١ مل؛ فقد يتم إعطاء حقن متعددة واحدة تلو الأخرى.

كيف يتم إعطاء أسفوتيز ألفا؟


يتم إعطاء أسفوتيز ألفا إما ثلاثة أو سنت مرات في الأسبوع كحقنة تحت الجلد في الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة وتقع فوق العضلات مباشرة.

توجد مساحات معينة من الجسم مناسبة لإعطاء الحقن تحت الجلد للرُّضُّع والأطفال، وقد تم توضيحيها في المخطط أدناه. وكقاعدة عامة: تلك المناطق هي المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون تحت الجلد. وفي الغالب يكون الفخذان والبطن هما أنساب المناطق لحقن الرُّضُّع والأطفال.

عند الحقن المنتظم، من الضروري أن يتم تغيير مواضع الحقن (مكان في الجسم يتم فيه إعطاء الحقن) للحد من خطر الألم، والتهيج، والحُلُّ الشمسي (نُكُّل الدهون أو فقدانها).

مع نمو رضيعك أو طفلك قد تصبح بعض المناطق الأخرى مناسبة، مثل: الذراعان، والأرداد.

يُرجى إجراء مناقشة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك بخصوص أفضل المواضع لحقن رضيعك أو طفلك.



نرجو أن تذكر أن هذا الدليل أُعد كوثيقة داعمة للتدريب الذي قدمه لك مقدم الرعاية الصحية الخاصة بطفلك.

كيفية حقن سترينسيك® (أسفوتيز ألفا)؟

قبل أن تبدأ قم بإخراج القارورة (القوارير) من الثلاجة قبل ١٥ إلى ٣٠ دقيقة قبل الحقن للسماح للسائل بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة (حوالى ٢٣ إلى ٢٧ درجة مئوية). لا تقم بتدفئة أسفوتيز ألفا بأي طريقة أخرى، على سبيل المثال: (لا تقم بتدفئة الدواء في الميكرويف أو في الماء الساخن). بعد إخراج القارورة من الثلاجة يتم إعطاء أسفوتيز ألفا خلال ٣ ساعات. للمزيد من المعلومات عن تخزين أسفوتيز ألفا راجع صفحة ١٤.

نرجو أن تذكر أن القوارير معدّة للاستخدام مرة واحدة فقط، ويجب ألا يتم ثقبها إلا مرة واحدة. كما يجب التخلص من القوارير المستخدمة بعد الانتهاء من الحقن.

اغسل يديك بعناية بالماء والصابون.

ضع جميع الأدوات التي سوف تحتاجها في مكانٍ نظيفٍ؛ بحيث لا يُعبث بها. وتتضمن تلك الأدوات ما يلي:

- قارورة (قوارير) الحقن الخاصة بطفلك.
- الحقن الخاصة بطفلك.
- إبرة محقنة ذات تجويف كبير، على سبيل المثال (٥٠ عيار).
- إبرة محقنة ذات تجويف صغير، على سبيل المثال (٢٧ أو ٢٩ عيار، بالطول المناسب للحقن تحت الجلد).
- مسحات كحول (عند الحاجة).
- شاش أو صوف قطني.
- حاوية للأدواء الحادة*.
- شريط لاصق أو ضمادة لاصقة (عند الحاجة).
- سجل لتسجيل يوميات الحقن (أو وسيلة أخرى من وسائل التسجيل).

ينصح بتسجيل موضع الحقن، والجرعة، والتاريخ، والوقت؛ لتجنب إعطاء حقنتين في نفس اليوم، ولضمان تغيير موضع الحقن. ويُستحسن أيضًا ملاحظة ظهور أي ردود فعل للحقن. اختر موضع الحقن (انظر الرسم البياني في الصفحة ٧) وقم بإعداده وفقًا للنصيحة المقدمة من قبل أخصائي الرعاية الصحية لطفلك.

*يُقدم لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك النصيحة بخصوص كيفية الحصول على حاوية الأدواء الحادة، وسيُقدم لك النصيحة بخصوص إجراءات التخلص منها.

كيفية حقن أسفوتيز ألفا؟

الخطوة ١: تحضير جرعة أسفوتيز ألفا


١. استخدم دائمًا قارورة جديدة وافحص السائل بعناية؛ حيث يجب أن يبدو شفافًا وعديم اللون مائلًا للأصفر قليلاً، وقد يحتوي على عدد قليل من الجسيمات الصغيرة الشفافة أو البيضاء.
لا تستخدم الدواء إذا تغير لون السائل أو إذا احتوى على أي كتل أو جزيئات كبيرة، واستبدل به بقارورة جديدة.

انزع غطاء الحماية (المُوضّح باللون الأحمر في الشكل) عن القارورة لإظهار السداد المطاطي المُعَقّمة.



٢. ضع الإبرة ذات التجويف الكبير، على سبيل المثال (٢٥ عيار) في المحقنة الفارغة، ثم أدخل الإبرة في المحقنة مع وجود الغطاء الواقي، ثم حركها تجاه عقارب الساعة حتى تصبح محكمة.

انزع الغلاف البلاستيكي الذي يُغطّي إبرة المحقنة، وتخلص منه في حاوية الأدوات الحادة.
انتبه حتى لا تؤدي نفسك بالإبرة.
اسحب المكبس للخلف، وذلك لسحب الهواء إلى داخل المحقنة بما يعادل جرعة طفلك.




الخطوة ٢: سحب محلول أسفوتيز ألفا من القارورة

٣. امسك المحقنة والقارورة، وأدخل الإبرة عبر الغطاء المطاطي المُعَقّم وداخل القارورة.
ادفع المكبس بالكامل للأمام لحقن الهواء داخل القارورة.




كيفية حقن أسفوتيز ألفا؟


٢. اقلب القارورة والمحقنة. ومع وجود الإبرة في المحلول اسحب المكبس لسحب الجرعة الصحيحة داخل المحقنة



٣. قبل نزع الإبرة من القارورة؛ افحص المحقنة للتحقق من عدم وجود فقاعات هوائية في حالة ظهور فقاعات في المحقنة قم بحمل المحقنة والإبرة منتهية إلى الأعلى، وانقر برفق على جانب المحقنة حتى ترتفع الفقاعات إلى الأعلى.



٤. بمجرد ارتفاع جميع الفقاعات إلى أعلى المحقنة؛ اضغط على المكبس برفق لإخراج الفقاعات من المحقنة وإعادتها إلى القارورة. بعد إزالة الفقاعات تحقق من جرعة الدواء الموجودة في المحقنة؛ لكي تتأكد من أنك قد قمت بسحب الكمية الصحيحة. قد تحتاج إلى استخدام أكثر من قارورة واحدة لسحب الكمية الكاملة التي تحتاجها للوصول للجرعة الصحيحة.



كيفية حقن أسفوتيز ألفا؟


الخطوة ٣: وضع الإبرة في المحقنة من أجل عملية الحقن

١. انزع الإبرة من القارورة، وأعد تغطيتها بيد واحدة عن طريق وضع الغطاء على سطح مستوى، ثم أدخل الإبرة في الغطاء، وارفعها لأعلى وثبتت الإبرة بإحكام باستخدام يد واحدة فقط.

٢. قم بإزالة الإبرة المُغطّاة ذات التجويف الكبير بدفعها إلى الأسفل وإدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة، وتخلص منها في حاوية الأدوات الحادة.



٣. ضع الإبرة ذات التجويف الأصغر، على سبيل المثال (٢٧ أو ٢٩ غ) في المحقنة المملوئة ثم ادفعها للأسفل مع وجود الغطاء الواقي، وحرك الإبرة في المحقنة باتجاه عقارب الساعة حتى تصبح مُحكمة. انزع الغطاء عن الإبرة وتخلص منه في حاوية الأدوات الحادة.



٤. أمسك المحقنة والإبرة موجهة نحو الأعلى، وانقر على جسم المحقنة بأصبعك لإزالة أي فقاعات هوائية. بعد إزالة الفقاعات الهوائية تحكم بصرياً في حجم الدواء الموجود في المحقنة؛ وذلك لتأكد من أنك قد قمت بسحب الكمية الصحيحة. الآن قد أصبحت جاهزاً لحقن الجرعة الصحيحة.



كيفية حقن أسفوتيز ألفا؟

الخطوة ٤: حقن أسفوتيز ألفا

يرجى الرجوع إلى القسم بعنوان "كيف يتم إعطاء أسفوتيز ألفا؟" في الصفحة ٧ لتحديد أفضل موضع لحقن رضيعك أو طفلك (الفخذان، أو البطن، الذراعان، العضلة الدالية، أو الأرداف).

١. احمل رضيعك أو طفلك بإحكام في وضع مريح.

سيُقْدِّم لك مقدم الرعاية الصحية النصيحة بخصوص أفضل الأوضاع لحمل رضيعك أو طفلك لحقنه في موضع الحقن الذي يتم اختياره.



٢. أمسك الجلد في المنطقة المختارة للحقن (في هذه الحالة فخذ رضيعك أو طفلك) بين أصبعيك السبابة والإبهام.



٣. أمسك المحقنة مثل: القلم، وقم بإدخال الإبرة داخل الجلد الممسوك باليد بزاوية ٤٥ إلى ٩ درجة إلى سطح البشرة. بالنسبة للأطفال صغار الحجم الذين لديهم كمية قليلة من الدهون تحت الجلد أو ذوي الجلد الرقيق؛ قد تكون الزاوية ٤٥ درجة هي الأفضل لهم.



كيفية حقن أسفوتizer ألفا ؟

٤. استمر في الإمساك بالجلد ثم ادفع مكبس المحقنة لحقن الدواء ببطء وثبات حتى تنتهي الكمية.

أخرج الإبرة واترك الجلد الذي تمسك به، ثم ضع المحقنة في حاوية الأدواء الحادة، ثم ضع برفق قطعة من الصوف القطني أو الشاش على مكان الحقن لبعض ثوان. يساعد ذلك على سد النسيج المثقوب ومنع أي تسرب. لا تفرك مكان الحقن بعد الحقن.



٥. تخلص من المحقنة والقارورة المستخدمة والإبرة في حاوية الأدواء الحادة. سوف يقدّم لك الطبيب المعالج لطفلك أو الصيدلي أو الممرضة النصيحة بخصوص كيفية الحصول على حاوية الأدواء الحادة.



٦. إذا كنت بحاجة إلى إعطاء محقنة ثانية لإكمال الجرعة الموصوفة لطفلك، فقم بإحضار قارورة ثانية من دواء أسفوتizer ألفا وكرر جميع الخطوات السابقة.

القوارير معدّة للاستخدام مرة واحدة فقط، ويجب ألا يتم ثقبها إلا مرة واحدة.
ضع لاصقة صغيرة أو ضمادة لاصقة على موضع الحقن عند الضرورة.

٤

٥


كيفية حقن أسفوتيز ألفا؟

V

٧. سُجّل جميع تفاصيل الحقن الخاصة بطفلك في سجل الحقن أو استخدم أيّ وسيلة أخرى.

من المُستحسن أن تدوّن ما يلي:

- المكان الذي حقنت فيه.
- الجرعة التي تم حقنها.
- تاريخ ووقت الحقن.
- أي ردود فعل على الحقن.



إذا كانت لديك أيّ مخاوف بخصوص ردود الفعل الناتجة عن الحقن، أو تحضير الدواء، أو إعطائه لرضيعك أو طفلك؛ فناقشها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك.

تخزين سترينيسيك® (أسفوتيز ألفا) والسفر أثناء استخدامه

تخزين قوارير أسفوتيز ألفا الخاصة بطفلك

- خذ قوارير أسفوتيز ألفا الخاصة بطفلك في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح ما بين ٢ و ٨ درجة مئوية. لا تضع أسفوتيز ألفا في الفريزر أو بالقرب منها، ولا تقم أبداً بحقن أسفوتيز ألفا الذي تعرف أنه قد تم تجميده من قبل أو تشك في تعرّضه للتجمد.
- قم ب تخزين أسفوتيز ألفا الخاص بطفلك في العبوة الأصلية لحماية الدواء من الضوء.
- قبل أن تبدأ تحقق من تاريخ صلاحية أسفوتيز ألفا الموجود على ملصق القارورة. لا تستخدم الدواء بعد انتهاء صلاحيته.

السفر مع اصطحاب قوارير أسفوتيز ألفا

- احسب عدد القوارير التي يحتاجها طفلك خلال الرحلة. خذ بعض القوارير الإضافية في حالة ما إذا استمر سفرك لمدة أطول من المُتوقع.
- تذكّر أن تأخذ حاوية الأدواء الحادة وبعض المحاقدن الإضافية. من المُستحسن أن تحمل لوازم طفلك ضمن الأمتعة التي تحملها في يديك.

- تحقق من أن المكان الذي سوف تসافر إليه يحتوي على ثلاثة يمكنك استخدامها.
- من المستحسن أن تحمل القوارير الخاصة بطفلك في حقيبة تبريد أثناء السفر، وأن تحتوي الحقيبة على مكعبات تبريد لحفظ على القوارير الخاصة بطفلك في درجة الحرارة الصحيحة.
- احفظ مكعبات التبريد في حجرة التجميد؛ بحيث تكون جاهزة للاستخدام عند سفرك. تأكد من أن مكعبات التبريد المجمدة لا تلامس دواء طفلك بصورة مباشرة.
- **السفر جواً**
- من المستحسن أن تحمل دواء طفلك ومستلزماته ضمن الأمتعة التي تصطحبها معك على متن الطائرة.
- قد يكون من المستحسن أن تحمل تقريراً من طبيب رضيعك أو طفلك يشرح فيه أنه بحاجة لاصطحاب دوائه عند السفر.
- راجع الخطوط الجوية أو المطار الذي تساور منه لمعرفة أيّ قواعد خاصة تتعلق بالأشخاص الذين يحملون أدوية تؤخذ عن طريق الحقن وملحقاتها.
- إذا كنت تشعر بأيّ مخاوف لها علاقة بالسفر؛ ناقشها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك.

جهات الاتصال المحلية

لمزيد من المعلومات حول STRENSIQ® أو في حالة وجود أي مخاوف تتعلق بالسلامة ، يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك أو الصيدلي أو الممرضة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا عانى طفلك أو رضيعك من أي آثار جانبية ، فتتعدد إلى مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذا الدليل.

يجب الإبلاغ عن عارض جانبي (الآثار الجانبية للدواء).

في حالة وجود مخاوف تتعلق بالسلامة ، يرجى الاتصال بـ:
المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية (NPC) ،
مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/>

أو

قسم التيقظ والسلامة الدوائية في أسترازينيكا

<https://contactazmedical.astrazeneca.com>
ksa.ae@astrazeneca.com
+966 11 2249235

بالإبلاغ عن الآثار الجانبية يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء

