

معلومات سلامة المريض

سيبينكو (أبروسيتينيب) – بطاقة المريض

هذه البطاقة معتمدة من الإدارة التنفيذية لتتقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسمك:

اسم طبيبك (الذي وصف دواء سيبينكو):

رقم هاتف الطبيب:

تاريخ بدء تلقيك لدواء سيبينكو:

معلومات السلامة للمرضى:

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات السلامة الهامة التي يجب أن تكون على علم بها – قبل وأثناء العلاج بدواء سيبينكو.
- للحصول على معلومات إضافية قم بقراءة نشرة معلومات المريض الموجودة في كل عبوة من دواء سيبينكو.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت أي معلومة غير واضحة.

احتفظ بهذه البطاقة معك واعرضها على أي مقدم للرعاية يشارك في رعايتك الطبية، على سبيل المثال، طبيبك الصيدلي أو طبيب الطوارئ.

يجب أن تكون على وعي بخصوص بعض الآثار الجانبية والموضوعات المدرجة أدناه، تحدث إلى طبيبك عند إصابتك بأي آثار جانبية:
الإصابة بالعدوى (بما في ذلك الهربس النطاقي والعدوى الانتهازية والخطيرة):

- خطر الإصابة بالعدوى.
- لا تتلقى دواء سيبينكو إذا كانت لديك أي عدوى خطيرة نشطة، بما في ذلك السل.
- قم بإبلاغ طبيبك على الفور في حالة:
إصابتك بأعراض العدوى مثل الحمى والتعرق، أو القشعريرة أو آلام العضلات، أو السعال أو ضيق التنفس، أو ظهور دم في البصاق، أو خسارة الوزن أو الإسهال أو ألم المعدة، أو حرقان أثناء التبول أو زيادة عدد مرات التبول عن المعتاد، أو الشعور بإجهاد شديد.

إصابتك بأي أعراض لعدوى الهربس (الحزام الناري)، مثل طفح جلدي مؤلم مع بثور.

إصابتك حاليًا أو سابقًا بداء السل أو اختلاطك بشخص مصاب بالسل.

اللقاحات:

تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا كنت قد تلقيت حديثًا أو تخطط لتلقي أي لقاحات (تحصينات)؛ وذلك لأن بعض اللقاحات الحية (مثل: لقاح الجدري المائي، ولقاح الهربس النطاقي، ولقاح الأنفلونزا) لا يوصى بتلقيها فورًا بعد أو أثناء استخدام دواء سيبينكو.

تكون خثرات داخل الأوردة [تعرف باسم التخثر الوريدي العميق] أو الرنتين [تعرف باسم الانصمام الرئوي].

أخبر طبيبك على الفور عند:

معلومات سلامة المريض

سيبينكو (أبروسيتينيب) – بطاقة المريض

- إصابتك بخثرات دموية في أوردة الساق (تخثر وريدي عميق) أو الرئتين (انصمام رئوي)، أو إصابتك بضيق التنفس وألم الصدر وتورم مؤلم بالساق أثناء تلقي دواء سيبينكو؛ فرما تكون هذه علامات على تكون خثرات دموية وريدية.

الفحوصات المختبرية:

سوف يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات مختبرية (تشمل اختبارات ارتفاع مستوى الكوليستيرول) قبل بدء تلقي سيبينكو، وأثناء تلقيك لدواء سيبينكو قد يتم تعديل العلاج حسب الحاجة.

الحمل ومنع الحمل

يحظر استخدام دواء سيبينكو أثناء الحمل.

إذا كنتي سيدة في عمر الإنجاب يجب عليك استخدام طريقة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج باستخدام دواء سيبينكو ولمدة شهر على الأقل بعد جرعتك الأخيرة من دواء سيبينكو، تحذري إلى طبيبك بخصوص الطرق المناسبة لمنع الحمل.

- أخبري طبيبك على الفور في حالة حدوث حمل أو إذا كنتي تعتقدين في حدوث حمل أثناء العلاج.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها إلى

• المركز الوطني للتبليغ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء:

مركز الاتصال الموحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

هاتف مجاني: 8002490000

فاكس: +966-11-2057662

بريد الكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.gov.sa/>

• قسم البيقطة الدوائية لدى الشركة

بريد الكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

• للحصول على نسخ إضافية، يرجى إرسال بريد الكتروني وتفاصيل الاتصال بك والكمية المطلوبة إلى

SAU.AEReporting@pfizer.com

تاريخ الموافقة: ديسمبر-2021

رقم الإصدار: 1.3