



بطاقة تنبيه المريض

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من جانب الإدارة التنفيذية
للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

**العلاج باستخدام فينوس ميثوتريكسيت
" حقن الميثوتريكسات في محلول معقم 50 مجم/2 مل "**

اسم المريض:

يوم العلاج:

جرعة المريض:

اسم الطبيب ورقم هاتفه:

معلومات هامة للسلامة

معلومات وإرشادات الدواء: حقن الميثوتريكسات دواء مضاد للأبيض (وهو دواء يؤثر على طريقة نمو خلايا الجسم) ومثبط للمناعة (وهو دواء يقلل نشاط جهاز المناعة). يشار إلى دواء الميثوتريكسات لعلاج أمراض الأورام، مثل أورام الأرومة الغاذية وسرطان الدم، وعلاج أعراض الحالات المتأخرة من الصدفية المستعصية التي لا تستجيب بشكل كافٍ لأنواع العلاج الأخرى.

تحذير موجز:

- لا تأخذ أكثر من الجرعة المحددة وإذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مفرطة) لميثوتريكسات.
- إذا كنت تعاني من حساسية مفرطة أو كنت تعاني من بصبق دم أو السعال حتى خروج الدم، اتصل بالطبيب على الفور.
- تشمل أعراض الجرعة الزائدة التهاب الحلق، والحمى، وتقرحات الفم، والإسهال، والتقيؤ، والطفح الجلدي، والنزيف أو الضعف غير العادي.
- استخدم حقن الميثوتريكسات مرة واحدة فقط في الأسبوع لعلاج الصدفية.
- يجب تجنب تناول الكحول أثناء العلاج بالميثوتريكسات.
- يسبب المنتج الطبي (على نحو محتمل) تشوهات للجنين ويتطلب استخدام وسائل منع حمل فعالة أثناء العلاج ولمدة ستة أشهر على الأقل بعده.
- اعرض هذه البطاقة دائماً على مختصي الرعاية الصحية غير الملمين بعلاجك بالميثوتريكسات لاطلاعهم على علاجك، على سبيل المثال إذا ذهبت إلى المستشفى أو حدث تغيير في خطة الرعاية.
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى أيضاً، يرجى مناقشة الأمر مع طبيبك.
- لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة نشرة المريض الموجودة في عبوة الأدوية الخاصة بك

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء، يمكنك التواصل مع:

مركز مسند فارما للاستشارات قسم التيقظ الدوائي نيابة عن شركة فينوس:

• البريد الإلكتروني: mpv@mesned.com

المركز الوطني للتيقظ الدوائي (NPC) الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA):

• مركز الاتصال الموحد على الرقم: 19999

• البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

• الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa/>