

معلومات هامة لتقليل المخاطر للمريض  
بطاقة تنبيه المريض

ريفاكس (ريفاروكسبان)  
٢,٥ ملجرام , ١٠ ملجرام, ١٥ ملجرام , ٢٠ ملجرام أقراص

احتفظ دائما بهذه البطاقة معك  
قدم هذه البطاقة لكل طبيب أو طبيب أسنان قبل العلاج أو إجراء عملية جراحية

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:  
للإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:  
المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء  
مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩  
البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa  
الموقع الإلكتروني: https://ade.sFDA.gov.sa  
معلومات الاتصال بحامل ترخيص التسويق:  
شركة أماروكس السعودية الصناعية  
رزان المالكي - أخصائي التيقظ الدوائي  
شارع الجامعة - الملز - الرياض كود ١٢٦٢٩ ، المملكة العربية السعودية.  
الهاتف: +966 11 266 8850  
جوال: +966531215235  
البريد الإلكتروني: r.almalki@amaroxpharma.com

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

### ➤ ما الذي يجب أن أعرفه عن ريفاكس؟

- ريفاكس يؤدي إلى سيولة الدم ، مما يمنعك من الإصابة بجلطات دموية خطيرة.
- يجب أن يؤخذ ريفاكس تماما كما هو موصوف من قبل الطبيب. لضمان الحماية المثلى من جلطات الدم ، لا تفوت جرعة أبدا.
- يجب ألا تتوقف عن تناول ريفاكس دون التحدث أولاً إلى طبيبك لأن خطر الإصابة بجلطات الدم قد يزيد.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية أخرى تتناولها حالياً أو تناولتها مؤخراً أو تنوي البدء في تناولها قبل أن تبدأ ريفاكس.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنك تتناول ريفاكس قبل أي عملية جراحية أو إجراء جراحي.

### ➤ كيف أتناول ريفاكس؟

- لضمان الحماية المثلى لريفاكس:
- يمكن تناول ٢,٥ ملجرام و ١٠ ملجرام مع الطعام أو بدونه
- يجب تناول ١٥ ملجرام و ٢٠ ملجرام مع الطعام

### ➤ متى يجب أن أطلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بي؟

- عند تناول أدوية سيولة الدم مثل ريفاكس ، من المهم أن تكون على دراية بآثاره الجانبية المحتملة. النزيف هو التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً.
- لا تبدأ في تناول ريفاكس إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر النزيف ، دون مناقشة ذلك أولاً مع طبيبك.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض للنزيف مثل ما يلي:
- ألم
- تورم و عدم ارتياح
- صداع أو دوخة أو ضعف
- كدمات غير طبيعية ، نزيف في الأنف ، نزيف اللثة ، جروح تستغرق وقتاً طويلاً لوقف النزيف
- تدفق الحيض أو النزيف المهبلي الأثقل من المعتاد
- دم في البول قد يكون برازاً وردياً أو بنياً أو أحمر أو أسود
- سعال مصحوب بالدم ، تقيؤ مصحوب بالدم ، تقيؤ مادة تشبه البن المطحون

### ➤ معلومات لمقدمي الرعاية الصحية:

لا ينبغي استخدام قيم INR لأنها ليست مقياساً يمكن الاعتماد عليه لنشاط سيولة الدم في ريفاكس.