

بطاقة طوارئ المريض

- ريفاروكسابان ام سي بي® 10 ملغم
- ريفاروكسابان ام سي بي® 15 ملغم
- ريفاروكسابان ام سي بي® 20 ملغم

Tick the prescribed dose

احمل هذه البطاقة دائما معك.

احرص على تقديم هذه البطاقة للطبيب أو طبيب الأسنان قبل أن يقوم بصرف علاج أو إجراء عملية جراحية لك.

• دم في البول وتلون البول باللون الوردي أو البني أو براز أحمر أو أسود اللون.

• سعال مصحوب بالدم أو تقيء الدم أو مادة تشبه البن المهطحون.

كيف أتناول ريفاروكسابان ام سي بي®؟

لتحصل على أقصى قدر من الحماية تناول ريفاروكسابان ام سي بي على النحو التالي:

10 ملغم مع أو بدون طعام

15 ملغم و 20 ملغم مع الطعام

ريفاروكسابان ام سي بي®

ريفاروكسابان



تم مراجعة وسائل خفض المخاطر هذه واعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

متى تلجأ للطبيب؟

يصحب تناول أدوية سيولة الدم عدد من الآثار الجانبية أهمها سرعة النزف.

لا تتناول ريفاروكسابان ام سي بي دون استشارة طبيبك المعالج إذا كنت معرضا للنزف أخطر طبيبك فورا إذا ظهرت عليك أعراض النزف أو أي من الأعراض التالية:

- اللام.
- التورم أو الشعور بعدم الارتياح.
- الصداع والدوار والضعف العام.
- التعرض للكدمات المتكررة وغير المفسرة والنزف من الأنف ومن اللثة ونزف بطني التوقف من الجروح.
- طهت أو نزيف مهبلي أكثر من المعدل المعتاد.

ما الذي ينبغي أن أعرفه أثناء العلاج بأقراص ريفاروكسابان ام سي بي®؟

• يؤدي العلاج ب ريفاروكسابان ام سي بي الى سيولة الدم ويقي من جلطات الدم الخطيرة

تناول (ريفاروكسابان ام سي بي) كما- وصفه لك • طبيبك المعالج تماما وأحرص على تناوله بانتظام دون السهو عن أي جرعة لضمان استمرار حمايتك من أي جلطات محتملة

• لا تتوقف عن تناول ريفاروكسابان ام سي بي قبل استشارة طبيبك المعالج خشية من أي جلطات

• أخطر الطبيب بأي أدوية أو علاج تتناوله حاليا أو كنت تتناوله في الماضي القريب أو تنوي تناوله في الفترة المقبلة قبل بداية العلاج بريفاروكسابان ام سي بي

• أخطر الطبيب أو الجراح أنك تتناول ريفاروكسابان ام سي بي قبل إجراء أي عملية جراحية أو علاج تداخلي

إني أتناول علاج بأقراص ريفاروكسابان ام سي بي® (ريفاروكسابان) لضمان سيولة الدم

أمراض أخرى/ علاج آخر

الاسم

العنوان

فصيلة الدم

تاريخ الميلاد

الوزن

في حالات الطوارئ، الرجاء الاتصال بالطبيب

كما يرجى إخطار

اسم الطبيب

تليفون الطبيب :

ختم / توقيع الطبيب :

الاسم

تليفون

درجة القرابة

معلومات هامة لمسؤولي الرعاية الصحية

لا يعتمد على نسبة التوحيد القياسي
للسيولة (آي-أن-آر) كمقياس دقيق لسيولة الدم
أثناء تناول العلاج بأقراص ريفاروكسابان ام
سي بي®

للإبلاغ عن أي آثار جانبية للدواء يرجى الاتصال:

مدينة الدواء للصناعات الدوائية - المملكة العربية السعودية
هاتف 09669200032880
فاكس 00966126358138
جوال 0096655786968
ص ب 42512 - جدة 21551
البريد الإلكتروني Pharmacovigilance-KSA@axantia.com

المركز الوطني للتبليغ الدوائي - المملكة العربية السعودية
للإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يرجى الاتصال بالمركز الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999 البريد الإلكتروني npc.drug@sFDA.gov.sa الموقع الإلكتروني

Axantia
BE BETTER

