

05

عليك زيارة الطبيب لمراجعة علاجك مرة واحدة على الأقل في السنة. إذا كنت تفكرين في إنجاب طفل أو تعتقدين أنك أصبحت حاملاً، فلا تتوقفي عن استخدام وسائل منع الحمل قبل التحدث إلى طبيبك.

إذا كنت تعانين من الصرع، فلا تتوقفي عن استخدام توبراميت ما لم يخبرك طبيبك بذلك، حيث قد تتفاقم حالتك.

اطلبي من طبيبك أن يعطيك دليل المريض ونسخة من نموذج التوعية السنوي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة الدواء.

تمت الموافقة على هذه الأنشطة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). للحصول على نسخ إضافية يرجى التواصل مع شركة تبوك الدوائية.

06



يرجى الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها عبر:
قسم التيقظ الدوائي (شركة تبوك الدوائية):

Any suspected adverse reactions should be reported to:
Pharmacovigilance department in (Tabuk Pharmaceuticals):
Email: pv.info@tabukpharmaceuticals.com
Tel: +966114774946

الهيئة العامة للغذاء والدواء - المركز الوطني للتيقظ الدوائي SFDA.
SFDA Call Center: 19999 Fax: +7662-205-11-966
E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa
Website: https://ade.sfda.gov.sa
Revision: 01 / Date: 21 July, 2024

01

Ipramax® | **إبرماكس®**
Topiramate | توبراميت

Patient Alert Card

Keep this card.



بطاقة تبيه مريض

احتفظ بهذه البطاقة

Ipramax®
Topiramate

What must you know?

IPRAMAX® (Topiramate) is a medicine for epilepsy and migraine headaches. Topiramate can seriously harm an unborn child if taken during pregnancy.

What must you do?

Read the package leaflet and Patient Guide carefully before use. Use highly effective contraception during your treatment with Topiramate and for at least 4 weeks after the last Topiramate dose.

Visit your doctor to review your treatment at least once a year. If you are thinking about having a child or think you have become pregnant, do not stop using contraception before you talk to your doctor.

If you have epilepsy, do not stop using Topiramate unless your doctor tells you to, as your condition may become worse. Ask your doctor for the Patient Guide and an annual awareness form.

For further information, please refer to the Package Leaflet.

This document is approved by the Saudi Food and Drug Authority (SFDA). For extra copies please contact Tabuk Pharmaceuticals.

إبرماكس®
توبراميت

ماذا يجب أن تعرف؟

إبرماكس (توبراميت) هو دواء يستخدم لعلاج الصرع وصداع الشقيقة. يمكن أن تسبب مادة توبراميت ضرراً كبيراً للجنين إذا تم تناولها أثناء الحمل.

ماذا يجب أن تفعل؟

اقرأ النشرة الداخلية ودليل المريض بعناية قبل الاستخدام. عليك استعمال وسائل منع الحمل الفعالة للحماية خلال فترة العلاج بـ توبراميت ولمدة لا تقل عن 4 أسابيع بعد آخر جرعة من توبراميت.

02

03

04