



بطاقة تنبئية للمرضى

تمت مراجعة وإعتماد هذه البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

اكزيفي ١٠٠ مليجرام
انثليكزيماب

أظهر هذه البطاقة لأي طبيب مشارك في علاجك.

تحتوي بطاقة معلومات السلامة للمرضى هذه على معلومات يجب أن تكون على دراية بها قبل وأثناء العلاج بدواء اكزيفي.^١

اسم المريض: _____
رقم الهاتف: _____
اسم الطبيب: _____

من المهم أن تقوم أنت وطبيبك بتسجيل اسم الدواء ورقم التشغيلة الخاصة بدوائلك.

ناريخ بدء العلاج بدواء اكزيفي: _____
ناريخ الدخول في الدورة الحالية: _____

٠ عند البدء في بطاقة جديدة، يرجى الإحتفاظ بهذه البطاقة لمدة أربعة أشهر إضافية لربما تحتاج للرجوع إليها.

٠ اقرأ بعناية نشرة المريض الخاصة بدواء اكزيفي قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

٠ احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة ٤ أشهر بعد آخر جرعة من اكزيفي، أو في حالة الحمل، لمدة ١٢ شهراً بعد ولادة طفلك.

٠ قد تحدث الآثار الجانبية بعد الوقت المطلوب من استخدام الدواء.

اطلب من طبيبك أن يقوم أدناه بتسجيل نوع وتاريخ آخر اختبار لفحص السل.

الاختبار: _____
التاريخ: _____
النتيجة: _____

قائمة بالأدوية الأخرى التي تتناولها: _____
العدوى

قبل استخدام دواء اكزيفي

٠ أخبر طبيبك إذا كنت مصاب بأي عدوى أو تصاب بكثرة بعدة أنواع من العدوى أو لديك عدوى تستمر في الرجوع مرة أخرى.^١

٠ من المهم جدًا أن تخبر طبيبك إذا كنت مصاباً بالسل من قبل أو خالطت شخصاً مصاباً أو كان مصاباً به. سيقوم الطبيب بإجراء اختبارك لمعرفة إذا كنت مصاباً بالسل.

٠ يجب أن يراقبك طبيبك بشكل مكثف بحثاً عن علامات وأعراض السل أثناء العلاج باكزيفي.^١

٠ أخبر طبيبك إذا كنت مصاباً بالالتهاب الكبدي الفيروسي بـ أو إذا كنت تعلم أو تشك أنك حامل للفيروس المسبب لهذا المرض.^١

٠ أخبر طبيبك إذا كانت لديك علامات عدوى مثل الحمى والسعال وأعراض شبيهة بالإنفلونزا.^١

٠ أخبر طبيبك إذا كانت لديك أي جروح مفتوحة أو نقرحات في جسمك.^١

٠ أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض السكري أو من مشكلة في الجهاز المناعي. الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات لديهم فرصه أكبر للإصابة بالعدوى.^١

٠ أخبر طبيبك إذا كنت تعيش أو عشت في أجزاء معينة من البلاد (مثل وديان أوهابو ونهر الميسسيسيبي) حيث يوجد خطوط متزايد للإصابة بأنيواع معينة من العدوى الفطرية (histoplasmosis أو blastomycosis أو coccidioidomycosis). قد تتطور هذه العدوى أو تصبح أكثر شدة إذا تلقيت اكزيفي.^١ إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت قد عشت في منطقة بها

شائع. أسأل طبيبك.^١

أثناء العلاج بدواء أكزيفي

أخبر طبيبك فوراً إذا كانت لديك عدوى أو أي علامة للعدوى تشمل حمى، سعال، أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو لديك جروح مفتوحة أو تقرحات في جسمك، اتصل بطبيبك على الفور.¹

مشاكل القلب

قبل استخدام دواء أكزيفي

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من قصور القلب أو أي مشاكل في القلب.¹

أثناء العلاج بدواء أكزيفي

• أخبر طبيبك على الفور إذا وجدت علامات جديدة أو علامات تدهور لقصور القلب أثناء العلاج بدواء أكزيفي.¹

• هذه العلامات تشمل: ضيق في التنفس، تورم في الكاحل أو القدمين وزيادة الوزن المفاجئة.¹

الحمل واللقاءات

• إذا كنت قد تناولت دواء أكزيفي أثناء الحمل فمن الممكن أن يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.¹

• إذا كان لديك طفل وكانت قد تناولت هذا الدواء عندما كنت حامل، فمن المهم أن تخبر طبيبك الطفل وغيره من الطاقم الطبي به حتى يتمكنوا من تحديد متى يجب أن يتلقى طفلك أي لقاح يجب أن لا يتم إعطاء طفلك "لقالح حي" مثل لقالح السيل BCG (للوقاية من السل) خلال الأئن عشر شهراً الأولى بعد الولادة.¹

• أخبر طبيبك بكل الأدوية التي تتناولها مثل الأدوية الموصوفة من طبيب أو الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية، الفيتامينات، والمكمّلات العشبية.¹

• احتفظي بهذه البطاقة معك لمدة أربعة أشهر بعد تناول آخر جرعة من دواء أكزيفي.¹

اكزيفي 100 مليجرام انفليزيماب

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المحتملة
يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية مباشرة إلى

المركز الوطني للتحقق بالهيئة العامة للغذاء والدواء 1999
بريد إلكتروني: npc.drugs@sFDA.gov.sa
الموقع الإلكتروني: <http://ade.sFDA.gov.sa>

وحدة سلامة الأدوية بشركة فايزر
بريد إلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

للحصول على نسخ إضافية، يرجى إرسال بريد إلكتروني
وتفاصيل الاتصال بك والكمية المطلوبة إلى SAU.AEReporting@pfizer.com



شركة فايزر العلمية الفنية المحدودة:

الرياض - حي العقيق

حي الملك عبدالله المالي، مبني ٤، ٧، ٤٣٥٩.

الرمز البريدي:

الهاتف: +٩٦٦١٢٢٩٣٥٠٠

الفاكس: +٩٦٦١٢٢٩٣٩٦