


كامزايوس® (مافاكامتن)
دليل المريض

المخاطر المحتمل حدوثها مع استخدام الدواء.

“تم اعتماد هذا الملف من قبل الادارة التنفيذية للتبيظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء.”



▼ يخضع كامزايوس لمراقبة إضافية. فهذا يتاح التعرف السريع على معلومات جديدة حول مدى أمان هذا الدواء. ويمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تظهر عليك.

المقدمة

قدّم لك دليل المريض هذا لأنّ الطبيب وصف لك دواء كامزايوس، وهو دواء قلب يُصرف فقط بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين باعتلال عضلّة القلب الضخامي الانسدادي (obstructive hypertrophic cardiomyopathy oHCM).

يُتضمن دليل المريض هذا بطاقة المريض.

مرحباً التأكد من استلام الطاقة.

أخبر مقدم الرعاية الصحية يتبع حالتك بذلك تتناول
كمزابوس.

تحتوي بطاقة المريض معلومات عن المخاطر الرئيسية لدواء كامزايوس وتفاصيل الاتصال بمقدم الوصفة.

كتاب زايدوس = ▼ (مما فاكاهة)

يُرجح الحرص على قراءة نشرة العبوة لهذا الدواء، مما يمنحك المزيد من المعلومات عن كامازيبوس.

إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى، تحدث مع مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي.

ما هو اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي
؟ (hypertrophic cardiomyopathy HCM)

يُسبب احتلال عضلة القلب الضخامي (HCM)، في زيادة سمك جدار عضلة القلب وتوسيعها، مما يجعل احتلاء القلب بالدم أكثر صعوبة. في بعض مرضى احتلال عضلة القلب الضخامي (HCM)، تصبح عضلة القلب سميكة لدرجة تعيق أو تقلل تدفق الدم من القلب إلى باقي الجسم.

كيف يعمل كامزايوس؟

يعمل كامزايوس عن طريق تقليل الانقباض المفطر للقلب وإعاقة تدفق الدم إلى الجسم. نتيجة لذلك، قد يحسن الأعراض التي تظهر عليك وقدرتك على ممارسة التمارين الرياضية.

ما هي مخططات صدى القلب، وما أهميتها؟

إن إجراء مخططات صدى القلب (أُعرف أيضاً بالإيكو) بانتظام يساعد طبيبك على تقييم مدى تأثير كامزايوس على قلبك. الإيكو عبارة عن اختبار يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للقلب. تتيح هذه الاختبارات للطبيب معرفة كيفية استجابة قلبك للعلاج والتأكد من أنك تتناول الجرعة الأمثل. بحسب نتائج الإيكو، قد يزيد الطبيب جرعتك من كامزايوس أو يقللها أو يبقيها كما هي أو يوقف العلاج بشكل مؤقت أو نهائي.

يُجرى الاختبار الأول للإيكو قبل البدء بتناول كامزايوس. تُجرى اختبارات المتابعة للإيكو بعد ٤ و ٨ وأسبوعاً من جرعتك الأولى من كامزايوس، ثم كل ٢٠ أسبوعاً بعد ذلك.

ستحتاج أيضاً لإجراء اختبارات الإيكو بحسب تعليمات الطبيب في حالة تغيير جرعتك من كامزايوس أو تغيير جرعتك من دواء آخر تتناوله.

من المهم ترتيب مواعيد اختبارات الإيكو و الالتزام
بإجرائها بحسب تعليمات مقدم الوصفة.
اضبط التذكيرات على هاتفك أو التقويم لمساعدتك
على تذكر تاريخ ووقت إجراء اختبارات الإيكو.



معلومات السلامة الهامة

ثمة ثلاثة مخاطر رئيسية مرتبطة بالعلاج بкамازايوس:

- الفشل القلبي الناجم عن قصور الوظيفة الازقباضية، وهي حالة يعجز فيها القلب عن ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم.
- الفشل القلبي الناجم عن التفاعلات مع بعض الأدوية والمكمّلات العشبية.
- سمية الجنين (حدوث تسمم للجنين)

الآثار الجانبية المحتملة الأخرى المرتبطة بкамازايوس موضحة في نشرة معلومات المريض.

كامازايوس والفشل القلبي

الفشل القلبي الناجم عن قصور الوظيفة الازقباضية حالة خطيرة وفي بعض الأحيان تكون مميتة.

أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب، أو طلب عناية طبية أخرى **فوراً** عند ظهور أعراض جديدة أو تفاقم أعراض الفشل القلبي، بما في ذلك ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو الإعياء، أو تسارع ضربات القلب (خفقان)، أو تورم الساق.

أخبر مقدم الوصفة أو الطبيب بأي حالات طبية جديدة أو حالية ظهرت عليك قبل وأثناء العلاج بкамازايوس. قد تؤثر بعض الحالات على العلاج بкамازايوس، مثل العدوى أو الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب وتتسارعها).

معلومات السلامة الهامة

كامزايوس والتدخلات الدوائية

قد تؤثر بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية متاحة تُصرف دون وصفة طبية، وبعض المكمّلات العشبية على مستويات كامزايوس في الجسم وقد تزيد خطر التعرض لفشل القلبي الناجم عن القصور الوظيفي الانقباضي. أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية والتي تُصرف بدونها والمكمّلات العشبية التي تتناولها، حتى وإن لم تكن تتناولها يومياً. لا تبدأ بتناول أي من أدويتك أو المكمّلات العشبية، أو تتوقف عن تناولها أو تغير جرعتها دون التحدث إلى مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي.

بعض الأمثلة على الأدوية والمنتجات التي قد تؤثر على مستوى كامزايوس في الجسم موضحة في **الجدول ١**. يرجى ملاحظة أن هذه الأمثلة بمثابة دليل ولا تعتبر قائمة شاملة لجميع الأدوية المحتملة التي قد تدرج تحت هذه الفئة. لا يوصى بالاستخدام المتقطع للمنتجات التي قد تؤثر على مستويات كامزايوس في الجسم، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية و تلك التي تُصرف بدونها، والمكمّلات العشبية و عصير الجريب فروت.

جدول ا: أمثلة على الأدوية والمنتجات التي قد تؤثر على كامزايوس

الحالة المعالجة	الأدوية/المنتجات
قرح المعدة وارتجاع الحمض	أوميبرازول، إيزوميبرازول
العدوى البكتيرية	كلاريثروميسين، ريفامبيسين
الحالات القلبية	فيرباباميل، ديلتيازيم
العدوى الغطرية	فلوكونازول، إيتراكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول، فوريكونازول
الاكتئاب	فلوكسيتين، فلوفوكسامين
فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)	ريتونافير، كوبيسبيستات
الالتهاب الكبدي سبي	تيلابريفير
	عصير الجريب فروت

معلومات السلامة الهامة

كامزايوس وسمية الجنين (حدوث تسمم للجنين)

يجب الامتناع عن تناول كامزايوس إذا كنت حاملاً أو لديك القدرة على الإنجاب ولا تستخدمين وسيلة منع حمل فعالة (تنظيم النسل)، فقد يتسبب كامزايوس في إلحاق الضرر بالجنين.

إذا كنت قادرة على الإنجاب، ستحتاجين إلى إجراء اختبار الحمل ويجب أن تكون النتيجة سلبية مؤكدة قبل البدء بتناول كامزايوس. يجب عليك استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل طوال مدة العلاج بكامزايوس ولمدة 1 أشهر بعد الجرعة الأخيرة منه. ينبغي عليك مناقشة وسيلة/وسائل منع الحمل الأنسب لك مع الطبيب.

استشيري طبيبك إذا ما كنت تفكرين في الإنجاب. إذا كنت حاملاً أو تشکین في أنك قد تكونين حاملاً أثناء العلاج بكامزايوس، أخبري مقدم الوصفة أو الطبيب على الفور. سيناقش معك مقدم الوصفة أو الطبيب الخيارات العلاجية المتاحة أمامك.

متى ينبغي علي طلب العناية الطبية؟

أخبر أي أخصائي رعاية صحية يتبع حالتك في حالة ظهور أي آثار جانبية أثناء تناول كامزايوس، حتى تلك التي لم تكن مدرجة في دليل المريض هذا. الآثار الجانبية المحتملة وتفاصيل كيفية الإبلاغ عنها موضحة أيضاً في نشرة معلومات المريض. يساعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية للهيئة العامة للغذاء والدواء على جمع المزيد من المعلومات حول مدى أمان هذا الدواء.

أخبر مقدم الوصفة، أو الطبيب، أو اطلب عناية طبية أخرى **فوراً** عند ظهور أعراض جديدة أو تفاقم أعراض الفشل القلبي، بما في ذلك ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو الإعياء، أو تسارع ضربات القلب (خفقان)، أو تورم الساق.

معلومات إضافية

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بكمزميروس، يرجى مناقشتها مع مقدم الوصفة، أو الطبيب أو الصيدلي أو أي عضو من فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك.

بطاقة تنبيه المريض هنا

ملاحظات



للإبلاغ عن أي أثار جانبية مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني:

 Bristol Myers Squibb™

المركز الوطني للتبيظ والسلامة الهيئة العامة

للغذاء والدواء:

19999 مركز الاتصال:

npc.drug@sfda.gov.sa البريد الإلكتروني:

<http://ade.sfda.gov.sa> الموقع الإلكتروني:

بريسنتول مايرز سكوب ب انترناشونال كوربوريشن،

المملكة العربية السعودية :

عبر البريد الإلكتروني: medinfo.saudiarabia@bms.com

أو الاتصال على رقم: 800 844 7710