

Electronic Certificate	
Document Number:	SA-OZU-240008
Document Name:	Ozurdex Patient Guide_Arabic
Certification Statement	
I hereby certify that I have examined the material referred to above and confirm that: 1. The piece has been approved according to the relevant Code, SOPs and Regulations 2. The information in the piece is balanced, accurate and a truthful presentation of the facts 3. When applicable, the content is consistent with the local Health Authority labeling document(s) 4. If applicable, the electronic version of the attached artwork is suitable for release to the market	
Role	Signature
Medical Certification	Ali Anwar Medical Director 24-Nov-2024 13:58:48 GMT+0000

دليل مريض Ozurdex[®]

(غرسة ديكساميثازون داخل الجسم الزجاجي بجرعة ٠,٧ ملغ)

يشتمل دليل المريض هذا على معلومات السلامة المهمة التي ينبغي أن تكون على علم بها قبل المعالجة باستخدام Ozurdex[®] وبعده.

2

لماذا يجب عليّ قراءة دليل المريض هذا؟

2

المعالجة

2

كيف يمكنني الاستعداد للمعالجة؟

3

ما الذي ستتضمنه معالجتني؟

3

ما الذي سيحدث بعد الخضوع لمعالجتني؟

4

أين يمكن العثور على المزيد من المعلومات

لماذا يجب عليّ قراءة دليل المريض هذا؟

قد ترتبط المعالجة بدواء Ozurdex® بالمخاطر التالية:

- ارتفاع ضغط العين، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالجلوكوما (مرض بالعين يسبب فقدان الرؤية).
- التهاب داخل العين (عادةً ما يحدث بسبب العدوى).
- لمنع حدوث تطور/تقليل العواقب الخطيرة، من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض المبكرة لهذه المخاطر المرتبطة بدواء Ozurdex®.

يجب عليك الاتصال بطبيبك أو ممرضتك على الفور إذا كنت تعاني في أي وقت من أي من هذه العلامات والأعراض بعد الخضوع للمعالجة بدواء Ozurdex®.

- تدهور الرؤية بعد الحقن.
- ألم أو شعور بعدم الراحة في العين أو في محيطها.
- زيادة العوامات والبقع في الرؤية.
- رؤية ضبابية تستمر لأكثر من يوم واحد بعد الحقن.
- احمرار العين ويستمر في التفاقم.
- إفرازات العين.

كيف يمكنني الاستعداد للمعالجة؟

قبل خضوعك للمعالجة، سيضع لك طبيبك قطرات مضاد حيوي للعين. يجب عليك استخدامها لمدة ثلاثة أيام قبل خضوعك للمعالجة. يجب عليك الاستمرار في استخدام قطرات العين لمدة ثلاثة أيام بعد خضوعك للمعالجة.

ما الذي ستتضمنه معالجتي؟

لتجهيزك للمعالجة، سيقوم الطبيب بما يلي:

- تنظيف عينك لتقليل فرص العدوى وقد يضع لك المزيد من قطرات مضاد حيوي للعين.
- تغطية وجهك بغطاء جراحي خاص.
- تخدير عينك باستخدام مواد التخدير لكي لا تشعر بالألم.
- استخدام جهاز لإبقاء عينك مفتوحة برفق.

ومن ثم سيستخدم الطبيب مطبقاً صمم خصيصاً لحقن الدواء في العين، من خلال الجزء الأبيض في عينك.

قد يمكنك سماع صوت تكة خلال هذا الإجراء كما ستشعر أيضاً بالقليل من الضغط في العين.

سيُجري بعد ذلك طبيبك فحوصات روتينية للعين للتأكد من إعطاء الدواء بنجاح.

ما الذي سيحدث بعد الخضوع لمعالجتي؟

بعد الحقن:

- قد تصبح رؤيتك ضبابية لمدة يوم واحد.
- قد ترى أيضاً بعض العوامات أو البقع، وهذا أمر عادي ويجب أن تختفي بمرور الوقت.
- في حال استمرار هذه الأعراض، أو تفاقم الأمر، يُرجى الاتصال بطبيبك.
- إذا كنت عادةً تقوم بالقيادة أو تستخدم الآلات، فلا ينبغي عليك استئناف هذه الأنشطة حتى تتوقف جميع أعراض الضبابية في الرؤية.

من أين يمكنك العثور على المزيد من المعلومات بخصوص دوائك



كما هو الحال مع جميع الأدوية، قد يُسبب دواء Ozurdex® آثارًا جانبية، ولكنها لا تحدث للجميع. يمكنك العثور على قائمة بالآثار الجانبية المحتملة والمزيد من المعلومات عن الدواء في نشرة معلومات المريض التي تأتي مع دواء Ozurdex®.

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخ إضافية من دليل المريض، فيُرجى التواصل مع PV.MEA@abbvie.com

يمكن الوصول إلى إصدار صوتي لدليل المريض هذا



للإبلاغ عن أي آثار جانبية من استخدام الدواء الخاص بك، يُرجى التواصل مع AbbVie
البريد الإلكتروني: PV.MEA@abbvie.com
الخط الساخن: +966558282010

للإتصال بالمركز الوطني للتبليغ – هيئة الغذاء والدواء السعودية
مركز الإتصال الموحد لهيئة الغذاء والدواء السعودية: 19999
الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

تمت الموافقة على هذه المادة التعليمية من قبل هيئة الغذاء والدواء.

SA-OZU-240008 – Prepared November 2024