

بطاقة المريض الريكسيفيو

احمل هذه البطاقة معك دائمًا. أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية مشارك في رعايتك أو إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئ.

معلومات هامة تتعلق بسلامة المرضى الذين يتلقون العلاج باستخدام الريكسيفيو:

للمريض

اتصل بـمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو احصل على مساعدة الطوارئ فورًا إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:

| | |
|--|------------------------------------|
| ارتفاع | 高三 (٣٨ درجة مئوية أو أعلى) |
| الشعور بقلة الانتباه | صعوبة في التنفس |
| مشكلة في التحدث أو الكتابة | قشعريرة |
| الخدر واللوزر (الشعور بالدوار والغثيان أو فقدان الاحساس) | صداع |
| | ضغط دم منخفض |
| | الشعور بالدوار |
| | سرعة ضربات القلب |
| | زيادة مسؤولي إنزيمات الكبد في الدم |

يجب عليك دائمًا سؤال طبيبك عن تناول أدوية أخرى أثناء تناول الريكسيفيو.

من المهم أن تذكري: قد يتطلب منك البقاء على مقربة من أحد مراقب الرعاية الصحية حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من مراقبتك بحثًا عن العلامات والأعراض يوميًا لمدة ٤٨ ساعة بعد جرعة "الزيادة التدريجية" الأولى، ولمدة ٤٤ ساعة بعد جرعة "الزيادة التدريجية" الثانية. إذا كان لديك أي من هذه الأعراض اتصل بطبيبك أو اطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور! هذه ليست جميع الأعراض المحتملة لـ الريكسيفيو. أخْرِ طبيبك إذا كان لديك أي أعراض تزعجك أو لا تزول.



 **Pfizer** Breakthroughs that change patients' lives®

Pfizer Scientific Technical Limited Company
Al Riyadh - Al Ageek Dis.

King Abdullah Financial District, Building 4.07
Postal Code 13519
Tel: +966 12 2293500
Fax: +966 12 2293692

لمقدمي الرعاية الصحية

معلومات هامة تتعلق بالسلامة يجب أن تعرفها: يمكن أن يسبب العلاج بالريكسيفيو مثلازمة إفراز السيتوكينات (CRS) أو التسمم العصبي، بما في ذلك مثلازمة السمية العصبية المرتبطة بالذريا المناعية (ICANS) والتي قد تكون خطيرة. قد تشمل مثلازمة إفراز السيتوكينات عدة أجهزة عضوية في الجسم.

لقد تلقى هذا المريض الريكسيفيو.



اسم طبيب علاج الأورام الريكسيفيو:

رقم هاتف المكتب:

رقم الهاتف بعد ساعات العمل:

اسم المنشأة الصحية:

مواعيد حقن الريكسيفيو:

الجرعة التدريبية الأولى

الجرعة التدريبية الثانية

الجرعة الكاملة الأولى

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

ينبغي الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المشتبه بها إلى:

المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

مركز الاتصال الموسود بالهيئة العامة للغذاء والدواء: ١٩٩٩٩

الهاتف المجاني: ٨٠٠٤٤٩٠٠٠٠

fax: ٩٦٦١٢٥٧٦٣٦

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

موقع الكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa/>

• قسم اليقظة الدوائية بالشركة

البريد الإلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

للحصول على نسخ إضافية، يرجى إرسال بريد إلكتروني يتضمن تفاصيل

الاتصال الخاصة بك والكمية المطلوبة إلى SAU.AEReporting@pfizer.com

هذه الوثيقة معتمدة من الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

VERSION 1, JANUARY 2025