

بيكيمف® (إيكوليزوماب)

بطاقة سلامة المريض

معلومات السلامة الهامة للمرضى الذين

يتلقون عقار إيكوليزوماب



أظهر هذه البطاقة لأي طبيب يتولى رعايتك.

يمكن عقار إيكوليزوماب أن يقلل من قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى. قد تحدث إصابات بحالات عدوى خطيرة بما في ذلك تهافت الدم، وخاصة عدوى المكورات السعائية، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية. إذا شعرت بأي من الأعراض التالية، يجب عليك الاتصال بطبيبك فوراً.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى طبيبك، فاذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ وأظهر لهم هذه البطاقة.

- صداع مع غثيان أوقيء
- ارتياب
- الام بالعضلات مع اعراض شبيهة باعراض الإنفلونزا
- حمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- حساسية العين تجاه الضوء
- الظهر

اطلب الرعاية الطبية الطارئة فوراً إذا كان لديك أي من هذه العلامات أو الأعراض **وأنظر هذه البطاقة.**



حتى إذا توقفت عن استخدام عقار إيكوليزوماب ، فاحتفظ بهذه البطاقة معك لمدة 3 أشهر بعد آخر جرعة لك من عقار بيكييف. قد يستمر خطر إصباتك بعدوى المكورات السعائية لفترة طويلة بعد آخر جرعة من عقار بيكييف.

إذا كنت تعاني أنت (أو طفلك) من عدم تحمل الفركتوز الوريثي (HFI)، وهو اضطراب وراثي نادر، فإنه يجب الا تلتقي أنت (أو طفلك) هذا الدواء. لا يستطيع المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الوريثي تكسير الفركتوز؛ مما قد يسبب آثارا جانبية خطيرة، مثل: نوبات تشنجية، غيبوبة، تأخر النمو (في الأطفال) وفشل الكلى والكبد.

بطاقة سلامة المريض

معلومات الطبيب المعالج

تم وصف عقار إيكوليزوماب لهذا المريض؛ مما يزيد من قابلية المريض للإصابة بعوادى المكورات السحاچية (النيسرية السحاچية) وغيرها من حالات العدوى العامة.



- قد تصبح عدوى المكورات السحاچية مهددة للحياة أو تؤدي إلى الوفاة بشكل سريع إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجهما مبكراً.
- عليك الخضوع للتقييم فوراً في حالة الاشتياه في الإصابة بالعدوى وعلاجهما بالمضادات الحيوية المناسبة إذا لزم الأمر.
- يُحظر استخدام عقار إيكوليزوماب في المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الوراثي بغض النظر عن أعمارهم، وفي الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والذين قد لا يتم تشخيص إصابتهم بعد تحمل الفركتوز الوراثي بعد.
- بعد تناول دواء يحتوي على السوربيتول عن طريق الوريد مثل عقار إيكوليزوماب، قد يصاب المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الوراثي بنقص سكر الدم، الحموض الاستقلالي، نوبات تشنجية، غيبوبة، ومن الممكن أن يكون مهدداً للحياة. عليك الخضوع للتقييم فوراً في حالة الاشتياه في وجود عدم تحمل الفركتوز الوراثي وعلاجه بشكل مناسب.
- اتصل بالطبيب الذي وصف الدواء (إذاً) في أسرع وقت ممكن.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول عقار بيكييف، يرجى الرجوع إلى النشرة الداخلية أو الوصول للمعلومات الطبية عبر البريد الإلكتروني على: medinfo-mea@amgen.com
- تفاصيل الاتصال للبلاغ عن الأحداث العكسية أو لطلب مزيد من المعلومات، يجب الإبلاغ فوراً عن أي تفاعلات عكسية مشتبه بها لجهات الاتصال المحلية المعنية بالسلامة في شركة أمجين أو المركز الوطني للتقطط الدوائي.

جهات الاتصال المحلية المعنية بالسلامة في شركة أمجين

هاتف: +966112799328

البريد الإلكتروني: safety-mea@amgen.com

المركز الوطني للتقطط الدوائي (NPC) بالهيئة العامة للغذاء والدواء

مركز اتصال الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

أونلاين عن طريق الإنترنت: <http://ade.sfda.gov.sa/>

يجب على المرضى الذين يتلقون عقار إيكوليزوماب حمل هذه البطاقة دائمًا

اسم المريض
المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج
اسم الطبيب
رقم الهاتف
تاريخ التطعيم ضد المكورات السحانية



عقار بيكيمف® بطاقة سلامة المريض_الإصدار 2.0، مارس 2025

هذه الوثيقة معتمدة من الإدارة التنفيذية للمقاطعة الدوائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء