



الدليل التوعوي الخاص
بالأدوية الشائع استخدامها
للأطفال والمواليد



شاركنا رأيك
في الدليل





المحتويات

4	مقدمة
5	الاستخدام الآمن لمستحضر الأسيتامينوفين ومستحضر الأيبوبروفين
9	إرشادات حول مستحضر الأموكسيسيلين ومستحضر الأوغمنتين
10	الاستخدام الآمن لمستحضر الديفينيدرامين ومستحضر اللوراتادين لعلاج الحساسية
12	الخاتمة
13	تواصل مع المركز الوطني للتيقظ

مقدمة:

تعد سلامة وفعالية استخدام الأدوية لدى الأطفال والمواليد أمراً حيوياً لإدارة صحتهم بشكل سليم. يهدف هذا الدليل إلى تقديم الأساسيات الخاصة باستخدام الأدوية الشائعة للأطفال، بما يشمل مسكنات الألم، والمضادات الحيوية، وأدوية الحساسية، والأدوية المضادة للالتهابات.

للحصول على نصائح طبية مخصصة، يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.



الاستخدام الآمن

لمستحضر الباراسيتمول (Paracetamol)
ومستحضر الأيبوبروفين (Ibuprofen)

الباراسيتامول

الاسم العلمي:

الباراسيتامول ويعرف أيضا بالأسيتامينوفين

الاسماء التجارية:



للاطلاع على الأسماء التجارية المسجلة
من خلال مسح الكود المرفق:

دواعي الاستخدام:

- ◀ لعلاج الألم الخفيف أو المتوسط والحمى المرتبطة بالتسنين.
- ◀ لعلاج ألم الأسنان والصداع.
- ◀ لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.
- ◀ يمكن استخدامه للرضع الذين يصابون بالحمى بعد التطعيم.

الجرعة:

يمكنكم حساب جرعة مستحضر الباراسيتامول المناسبة للأطفال
باستخدام الحاسبة المتاحة على موقع الهيئة العامة للغذاء
والدواء من خلال مسح الكود المرفق:



نصائح للسلامة عند استخدام مستحضر الباراسيتامول:

- ◀ لا يُعطى للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.
- ◀ لا يعطى إذا كان عمر طفلك بين 2-3 أشهر ووزنه أقل من 4 كجم.
- ◀ يجب ترك فترة لا تقل عن 4 ساعات بين الجرعات.
- ◀ لا تستخدم هذا الدواء لطفلك لأكثر من 3 أيام دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- ◀ تجنب استخدام المسكنات الخاصة بالبالغين.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عند إعطاء مستحضر الباراسيتامول لطفلك في الحالات التالية:

- ◀ إذا كان يتناول أي منتجات أخرى تحتوي على مستحضر الباراسيتامول
- ◀ إذا كان يعاني من مشاكل في الكبد.
- ◀ إذا كان لديه مشكلة وراثية نادرة تتمثل في عدم تحمل الفركتوز.

تجنب إعطاء مستحضر الباراسيتامول لطفلك إذا كان يعاني من حساسية تجاه مستحضر الباراسيتامول.



الأيوبروفين

الاسم العلمي:

الأيوبروفين

الاسماء التجارية:



للاطلاع على الأسماء التجارية المسجلة
من خلال مسح الكود المرفق:

دواعي الاستخدام:

- ◀ لعلاج الألم الخفيف أو المتوسط والحمى المرتبطة بالتسنين.
- ◀ تخفيف ألم الأذن والتهاب الحلق والإصابات الطفيفة.

نصائح السلامة:

- ◀ بالنسبة للأطفال في سن من 3 شهور إلى 6 شهور من العمر، إذا لم تنزل الأعراض خلال 24 ساعة تواصل مع الطبيب المعالج.
- ◀ تجنب استشارة الطبيب المعالج في حال استخدامه للرضع دون 3 أشهر.
- ◀ إعطاء الدواء مع الطعام أو الحليب لتجنب اضطراب المعدة.
- ◀ تجنب استخدامه في الأطفال الذين يعانون من الجفاف أو مشكلات الكلى.
- ◀ تجنب استشارة الطبيب المعالج إذا كان الطفل يعاني من الربو أو لديه تاريخ مرضي مع الربو أو أي مرض تحسسي آخر.

إرشادات حول مستحضر الأموكسيسيلين (AMOXICILLIN)

الاسم العلمي:

الأموكسيسيلين

الاسماء التجارية:



للاطلاع على الأسماء التجارية المسجلة
من خلال مسح الكود المرفق:

دواعي الاستخدام للأموكسيسيلين:

مضادات حيوية تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية (مثل التهاب الأذن، التهاب الحلق، الالتهاب الرئوي).

نصائح السلامة:

- ◀ يجب الالتزام بالجرعة والمدة المقررة من الطبيب وعدم التوقف عن تناول الدواء حتى مع التحسن.
- ◀ يأخذ مع أو بدون الوجبات، ويفضل تناوله مع الوجبات.
- ◀ اتباع نفس تعليمات التخزين وحفظ الأشكال السائلة في الثلاجة؛ رجاها جيداً قبل الاستخدام.
- ◀ مراقبة علامات الحساسية (مثل الطفح الجلدي، الحكة).
- ◀ توقف عن إعطاء الدواء لطفلك وقم باستشارة الطبيب المعالج أو الذهاب إلى أقرب مستشفى إذا واجهت طفلك أيا من الأحداث التالية: حساسية مفرطة، الإسهال الشديد، حساسية الجلد مع حكة، اصفرار الجلد أو بياض في العينين، صعوبة أو عدم الراحة في التبول أو وجود دم في البول.



الاستخدام الآمن

لمستحضر الديفينهيدرامين (DIPHENHYDRAMINE)

ومستحضر اللوراتادين (LORATADINE)

لعلاج الحساسية

اللوراتادين

الاسم العلمي:

اللوراتادين

الاسماء التجارية:

للاطلاع على الأسماء التجارية المسجلة
من خلال مسح الكود المرفق:



دواعي الاستخدام:

- ◀ علاج التهاب الأنف التحسسي وغيرها
من أعراض الحساسية الموسمية.
- ◀ سيلان الأنف وحكة الأنف المزمنة.
- ◀ تخفيف الأعراض المرتبطة بالأرتكازيا
(حالة جلدية تسببها الحساسية).

الديفينهيدرامين

الاسم العلمي:

ديفينهيدرامين

الاسماء التجارية:

للاطلاع على الأسماء التجارية المسجلة
من خلال مسح الكود المرفق:



دواعي الاستخدام:

- ◀ علاج ردود الفعل التحسسية (مثل
الطفح الجلدي، لدغات الحشرات).
- ◀ تخفيف أعراض الكحة والاحتقان.

نصائح السلامة:

- « ديفينهيدرامين يسبب النعاس لذا يجب تجنب استخدامه مع المهدئات الأخرى.
- « يستخدمان للأطفال بعمر 6 سنوات فما فوق.
- « يجب قياس الجرعة السائلة بدقة.
- « يمكن أن يؤخذ مع أو بدون الطعام.
- « يجب التوقف عن تناول مضادات الهيستامين قبل 48 ساعة من أي إجراءات لاختبار الجلد.

الخاتمة:

يتطلب الاستخدام الآمن للأدوية لدى الأطفال والواليد الجدد الامتثال الصارم لتعليمات الجرعة ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة. استشر دائمًا مقدمي الرعاية الصحية قبل إعطاء أي دواء وتابع النصائح الخاصة بهم. من خلال البقاء على اطلاع والحرص.

في حال ظهور أعراض جانبية تواصل مع المركز الوطني للتبليغ عبر القنوات التالية:



npc.drug@sfda.gov.sa
البريد الإلكتروني

19999

الرقم الموحد



الإبلاغ الإلكتروني

