

معلومات هامة

إيلارس[®]
(كاناكينوماب)

١٥٠ ملغم حقنة تحت الجلد
لعلاج نوبات التهاب المفاصل النقرسي

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:



الرقم المجاني: ٨٠٠١٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الايميل: adverse.events@novartis.com
أو عن طريق الانترنت: <http://report.novartis.com/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء، المركز الوطني للتبيظ الدوائي:



مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الايميل: npc.drug@sfda.gov.sa
أو عن طريق الانترنت: <https://ade.sfda.gov.sa/>

تستحب المروقة على هذه المادة من قبل الإشارة التفصيية للتبيظ الدوائي في الهيئة العام للغذاء
والدواء في المملكة العربية السعودية.

Ilaris® (canakinumab) SFDA approved RMP

Educational Materials V.11.2 Jul 2023



قبل البدء في استخدام كاناكينوماب

- **العدوى:** يجب ألا تبدأ العلاج بكاناكينوماب إذا كان لديك عدوى نشطة.
- **اللهاحات:** تحدث مع طبيبك حول أي لهاحات قد تحتاج إلى أخذها قبل بدء العلاج بكاناكينوماب.

أثناء العلاج بكاناكينوماب

- **خطر العدوى:** استخدام كاناكينوماب يرتبط بزيادة خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة.
إذا كنت في وضع عدوى قد تحتاج لوقف العلاج بكاناكينوماب **أخبر طبيبك مباشرة** إذا كانت لديك حرارة تدوم لفترة أطول من ٣ أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون سبب الإصابة بعدوى.
- عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل:
 - الحرارة، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة أو
 - أحمرار موضعي، دفع أو تورم في الجلد أو
 - استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم.
- **الحمل:**

إذا كنت تستخدم كاناكينوماب أثناء فترة الحمل، من المهم إبلاغ طبيب الطفل أو الممرضة قبل تلقيه أي لهاج يجب ألا يتلقى طفلك أي لهاحات حية قبل ١٦ أسبوع على الأقل من تلقيك الجرعة الأخيرة من كاناكينوماب قبل الولادة.

دليل العلاج

يرجى التأكد من اصطحاب **قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الآن عند زيارة الطبيب المختص.**

اسم المريض: _____

تاريخ أول جرعة من كاناكينوماب: _____

جرعة كاناكينوماب: _____

اسم الطبيب: _____

هاتف الطبيب: _____