

معلومات هامة

إيلارس®

(كاناكينوماب)

150 ملغم حقنة تحت الجلد

لعلاج متلازمات الحمى الدورية بما في ذلك:

- المتلازمة الدورية المرتبطة ببروتين كرايوبابيرين
- المتلازمة الدورية المرتبطة بمستقبل عامل نخر الورم.
- متلازمة فرط الغلوبولين المناعي دي و نقص ميفالونات كيناز
- حمى البحر المتوسط العائلية

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلل:
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:



الرقم المجاني: ٨٠٠١٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الإيميل: adverse.events@novartis.com
أو عن طريق الإنترنت: <http://report.novartis.com/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء، المركز الوطني للتيقظ الدوائي:



مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الإيميل: npc.drug@sfda.gov.sa
أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfda.gov.sa>

تمت الموافقة على هذه المادة من قبل الادارة المنقولة للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية

قبل البدء في استخدام كاناكينوماب

العدوى: يجب ألا تبدأ العلاج بكاناكينوماب إذا كان لديك عدوى نشطة تتطلب التدخل الطبي.

اللقالات: تحدث مع طبيبك حول أي لقالات قد تحتاج إلى أخذها قبل بدء العلاج بكاناكينوماب.

أثناء العلاج بكاناكينوماب

خطر العدوى:

استخدام كاناكينوماب يزيد خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة.

- اذا كنت في وضع عدوى قد تحتاج لوقف العلاج بالكاناكينوماب اخر طبيبك مباشرة اذا كانت لديك حرارة تدوم لفترة أطول من 3 أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون بسبب الإصابة بعدوى.

• عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل:

- الحرارة ، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة.
- احمرار موضعي، دفع، أو تورم في الجلد؛ أو
- استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

• الحمل:

اذا كنت تستخدم كاناكينوماب أثناء فترة الحمل، من المهم ابلاغ طبيب الطفل أو الممرضة قبل تلقيه أي لقال. يجب ألا يتلقى طفلك أي لقالات حية قبل 16 اسبوع على الأقل من تلقيك الجرعة الأخيرة من كاناكينوماب قبل الولادة.

دليل العلاج

يرجى التأكد من اصطحاب قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الان عند زيارة الطبيب المختص.

اسم المريض:

بالنسبة للأطفال اسم ولد الأمر/الوصى:

تاريخ اول جرعة من كاناكينوماب:

جرعه كاناكينوماب:

اسم الطبيب :

هاتف الطبيب: