

في حالة حدوث أي آثار جانبية مرتبطة بالدواء، يرجى التواصل مع :
المركز الوطني للتبقيظ والسلامة الدوائية (NPC) - الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية (SFDA)
مركز الاتصال: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa

الموقع الإلكتروني: https://ade.sFDA.gov.sa

للتواصل مع مركز التبقيظ الدوائية التابع لشركة سانوفي، يرجى الاتصال بـ: +966-44-284-797

البريد الإلكتروني: Ksa_pharmacovigilance@sanofi.com



اسم المريض _____
تاريخ أول مرة تم وصف تيرفلونوميدي للمريض:
المستشفى: _____

اسم الطبيب المعالج: _____

رقم الطبيب المعالج: _____

أوباجيو (تيرفلونوميدي) بطاقة المريض

تحتوي بطاقة المريض على معلومات سلامة مهمة يجب أن تكون على دراية بها عند تلقي
دواء تيرفلونوميدي. يرجى الرجوع إلى نشرة المريض للحصول على معلومات كاملة.

توجيهات عامة



يرجى إبراز هذه البطاقة لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية يقوم على رعايتك الطبية
(على سبيل المثال في حالة الطوارئ).

دواعي استخدام تيرفلونوميدي

يستخدم تيرفلونوميدي في البالغين و الأطفال و المراهقين 10 سنوات و ما فوق لعلاج مرض التصلب اللويحي
المتعدد الإنتكاسي الهانج

نسخة رقم 2 بتاريخ سبتمبر -2025

sanofi

تم اعتماد هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبقيظ الدوائي - الهيئة العامة للغذاء و الدواء

هذا الدواء يُقلّل من نشاط الجهاز المناعي (مُعزّل للمناعة). لدى بعض الأشخاص قد يسبّب تلفاً في الكبد (التهاب الكبد)، كما قد يُقلّل من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تُحارب العدوى والصفائح الدموية المسؤولة عن تخثر الدم

يجب فحص وظائف الكبد وضغط الدم بانتظام أثناء العلاج بالثيريفلونوميدي، كما ينبغي فحص تعداد الدم الكامل عند الضرورة. ويجب أيضاً إجراء هذه الفحوصات قبل بدء العلاج



إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية التالية، يرجى الاتصال بالطبيب المعالج لك على الفور:

- تحول لون البشرة أو بياض العين إلى اللون الأصفر أو البول الداكن أو الغثيان أو القيء وآلام في البطن.
- في هذه الحالة قد يكون لديك مشكلة في الكبد.
- ارتفاع في درجة الحرارة، أو رجفة، أو قشعريرة، أو انتفاخ في الغدد، أو انخفاض أو ألم في تدفق البول، أو اضطراب. في هذه الحالة قد يكون لديك عدوى.

لل سيدات في سن الإنجاب، بما في ذلك الفتيات وأولياء أمورهن/مقدّمو الرعاية لهن



- لا تبدي باستخدام ثيريفلونوميدي إذا كنتي حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً. قد يطلب الطبيب إجراء اختبار حمل للتأكد من ذلك منك
- استخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء استخدام أوباجيو وبعد التوقف عنه. سيقدّم لك طبيبك إرشادات حول المخاطر المحتملة على الجنين وأهمية استخدام وسيلة منع حمل فعالة
- اتّصلي بطبيبك فوراً إذا رغبت في تغيير وسيلة منع الحمل أو إذا كنت ترغبين في الحمل. إذا أصبحت حاملاً أو اعتقدت أنك حامل، توقّفي عن تناول ثيريفلونوميدي واتصلي فوراً.
- في حال حدوث حمل، قد يقترح طبيبك العلاج بأدوية معينة للمساعدة في تسريع إزالة ثيريفلونوميدي من جسمك. يجب عليك أيضاً مناقشة الأمر مع طبيبك إذا كنت تخططين للرضاعة الطبيعية أو تمارسينها حالياً.
- بالنسبة لأولياء الأمور/مقدّمي الرعاية للفتيات: يُرجى التواصل مع الطبيب عندما تبدأ الفئاة دورتها الشهرية لأول مرة من أجل الحصول على إرشادات حول المخاطر المحتملة على الجنين والحاجة إلى استخدام وسيلة منع حمل فعالة