

أوبسنفي (ماسيتينتان / تادالافيل)

بطاقة مريض

لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة يجب أن تكون على دراية بها عند تلقي العلاج باستخدام دواء ماسيتينتان / تادالافيل. احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات وأظهرها لأي طبيب يشارك في رعايتك الطبية.

أوبسنفي 10 مجم / 20 مجم: أقراص مغلفة بطبقة رقيقة
أوبسنفي 10 مجم / 40 مجم: أقراص مغلفة بطبقة رقيقة

من المهم إبلاغ طبيبك المعالج على الفور عن أي حمل أو أي آثار جانبية قد تحدث خلال العلاج باستخدام دواء أوبسنفي.

مركز العلاج:

اسم الطبيب المعالج:

رقم هاتف الطبيب المعالج:

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)
الإصدار 1، أغسطس 2025
اطوي هنا .

Johnson&Johnson

Opsynvi

الحمل

قد يؤدي دواء أوبسنفي إلى الإضرار بنمو الجنين. لذلك يجب عدم تناول أوبسنفي إذا كنتِ حاملاً، ويجب أيضاً عدم حدوث حمل خلال فترة تناول دواء أوبسنفي. علاوةً على ذلك، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، فقد يؤدي حدوث الحمل إلى تدهور شديد في أعراض مرضك.

وسائل منع الحمل

على النساء اللاتي يمكن أن يحملن استخدام وسائل منع الحمل الفعالة قبل البدء في تناول ماسيتينتان / تادالافيل. تحدثي مع مقدم الرعاية الصحية أو طبيب أمراض النساء (طبيب متخصص في الإنجاب) لمعرفة خيارات منع الحمل المقبولة التي يمكنك استخدامها لمنع الحمل أثناء العلاج بماسيتينتان / تادالافيل.

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
اطوي هنا

Johnson&Johnson

مثل الأدوية الأخرى من هذه الفئة، قد يكون لدواء أوبسنفي آثار جانبية على الكبد. سوف يُجري طبيبك اختبار دم قبل بدء العلاج بدواء أوبسنفي، وخلال فترة العلاج، لاختبار ما إذا كان الكبد يعمل بشكل صحيح.

تشمل الأعراض التي قد تشير إلى عدم عمل الكبد بشكل صحيح ما يلي:

- الغثيان (الرغبة في القيء)
- التقيؤ
- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- ألم في المعدة (ألم في الربع العلوي الأيمن)
- اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العينين)
- البول داكن اللون
- حكة في الجلد
- الخمول أو التعب (تعب أو إرهاق غير عادي)
- فقدان الشهية

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
اطوي هنا

Johnson&Johnson

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض،
فأخبر طبيبك على الفور.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول
علاجك، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.


Opsynvi®
macitentan/tadalafil
10 mg/40 mg tablets

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية
الهيئة العامة للغذاء والدواء (المركز الوطني للتحقق)
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
الخط المباشر: 19999
الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.gov.sa>

للحصول على معلومات عن طريقة استخدام الدواء، يرجى الرجوع إلى النشرة الداخلية أو التواصل مع
شركة جونسون أند جونسون للتجارة
(الرياض)
العنوان: شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، برج ب، الطابق 30، أبراج العليا
الهاتف: 00966-11-4339133
ص.ب: 65305 الرياض 11556، السعودية

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية وشكاوى عن المنتجات أو أي استفسارات طبية، يرجى التواصل معنا عبر
البريد الإلكتروني: GCC-PV2@its.jnj.com
الخط المباشر: 00966540015811

اطوي هنا

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

Johnson&Johnson

اطوي هنا

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

Johnson&Johnson

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

Johnson&Johnson