

بطاقة تنبيه للمريض

أنشطة خفض المخاطر هذه معتمدة من قبل الهيئة العامة
للغذاء والدواء

العلاج بكينيريت (أناكينرا)

اسم المريض:

اسم مقدم الرعاية (للأطفال): جرعة

المريض:

اسم الطبيب ورقم الهاتف:

معلومات هامة عن السلامة والمتعلقة بداء ستيل

تعد متلازمة تنشيط البلاعم (MAS) مضاعفات لداء ستيل. في حال لم يتم علاج هذه المتلازمة، فقد تهدد الحياة. يزداد خطر الإصابة بمتلازمة تنشيط البلاعم في حال أصبت بعدوى أو في حال لم تتم السيطرة على أعراض داء ستيل لديك بشكل ملائم. تتضمن أعراض متلازمة تنشيط البلاعم حمى شديدة مستمرة وانتفاخات العقد الليمفاوية والطفح المتكرر.

يمكن أن يؤدي كينيريت (أناكينرا) إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى الخطيرة. قد تتضمن الأعراض حمى شديدة مستمرة والرعشة والكحة والصداع، واحمرار ورقة الجلد. وقد تتضمن علامات العدوى أيضًا حمى خفيفة مستمرة وفقدان الوزن وكحة متواصلة.

في حال ظهر عليك علامات للعدوى أو تفاقمت أعراض داء ستيل لديك، فينبغي أن تتصل بمقدم الرعاية الصحية في أقرب فرصة ممكنة.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق الاتصال بـ

- المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية
- مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: <https://ade.sFDA.gov.sa>

- سويدش أورفان بيوثيرم أي بي (بويل):
- البريد الإلكتروني: pv-ksa@sobi.com



