


مقدمة

عن أويكلي (Awiqli®)

حقن الأنسولين أيكوديك

دليل المريض: معلومات هامة لتقليل المخاطر و لإستخدام آمن

الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي، الهيئة العامة للغذاء و
الدواء للغذاء والدواء السعودية (SFDA)



الإصدار ١,٠، أكتوبر ٢٠٢٤

المصادر:

١. ملخص خصائص المنتج في المملكة العربية السعودية على موقع نظام معلومات الأدوية السعودي (SDI):
(/https://sdi.sfda.gov.sa).

FlexTouch® و Awiqli® علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Novo Nordisk® A/S © Novo Nordisk® A/S
Bagsværd ٢٨٨٠- Novo Álle, DK، الدنمارك؛ تاريخ الموافقة: مايو ٢٠٢٤.

إخلاء مسؤولية:

• أُعد هذا الدليل التعليمي لأغراض التوعية وتقليل المخاطر فقط، ولا يجب اعتباره كمادة ترويجية أو تسويقية لمنتج أويكلي Awiqli®

يُرجى الإبلاغ عن أي آثار جانبية من خلال القنوات التالية:

• الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)

مركز الاتصال: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: /http://ade.sfda.gov.sa

• شركة نوفو نورديسك السعودية

البريد الإلكتروني: nngulfsafety@novonordisk.com

الموقع الإلكتروني: /https://www.novonordisk.com.sa

وُصف لك دواء أويكلي (Awiqli®) لعلاج مرض السكري. يهدف هذا الكتيب إلى تزويدك بالمعلومات اللازمة حول أويكلي (Awiqli®) لضمان تناولك العلاج الأسبوعي بانتظام وبطريقة صحيحة، وتجنب أي أخطاء دوائية. لمزيد من التفاصيل حول المنتج، يُرجى الاطلاع على النشرة المرفقة للمريض.



التحول من الأنسولين قاعدي آخر إلى أويكلي (Awiqli®)

- عند التحول من الأنسولين المستخدم مرة أو مرتين يومياً إلى أويكلي (Awiqli®)، يقوم الطبيب بتحديد الجرعة الأسبوعية بناءً على الجرعة الحالية من الأنسولين القاعدي ومستويات الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى.
- قد يصف الطبيب جرعة أولى أعلى من أويكلي (Awiqli®) لتلبية احتياجاتك للتحكم في السكر في الدم. وتكون هذه الجرعة المرتفعة مقتصرة على الحقنة الأولى فقط، ولا تُستخدم في الجرعة الثانية.
- تأكد قبل الحقن دائماً من أن الجرعة الموصوفة من أويكلي (Awiqli®) صحيحة، خاصة للحقنيتين الأولى والثانية، وتحقق من عدد الوحدات المختارة.
- خلال التحول إلى أويكلي (Awiqli®)، وخلال الأسابيع التي تليه، يُنصح بمراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر.

معلومات عامة:

- في حال حدوث أي أخطاء في الدواء أو آثار جانبية أثناء استخدام أويكلي (Awiqli®)، يجب الإبلاغ عنها على الفور لشركة نوفو نورديسك (تفاصيل الاتصال موجودة) أو للهيئة العامة للغذاء والدواء. استعن بطبيبك أو صيدلي أو ممرض إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
- إذا أخذت وحدات أكثر مما هو محدد من عقار أويكلي (Awiqli®)، قد ينخفض مستوى السكر في دمك بشكل مفرط. تحقق من مستوى السكر، وإذا لزم الأمر، تناول أقراص الجلوكوز أو وجبات خفيفة غنية بالسكر مثل الحلويات، البسكويت، أو عصير الفواكه.
- راجع التعليمات الموجودة في نهاية نشرة العبوة المتاحة داخل عبوة أويكلي (Awiqli®)، لتعرف كيف تتعامل إذا كان مستوى السكر في دمك مرتفعاً أو منخفضاً.
- لتفادي أخطاء الجرعة أو خطر الجرعة الزائدة، يُرجى عدم استخدام حقنة لإزالة المحلول من القلم.
- إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى استشارة طبيبك.

ما هو أويكلي (Awiqli®) وما الغرض من استخدامه؟

- أويكلي (Awiqli®) هو نظير الأنسولين القاعدي يُحقن مرة واحدة في الأسبوع لعلاج مرض السكري. يتميز بأنه طويل المفعول، ويُعطى مرة أسبوعياً للمساعدة في التحكم بمستوى السكر في الدم.
- ينبغي استخدام أويكلي (Awiqli®) مرة واحدة أسبوعياً فقط. يُرجى الالتزام بنظام الجرعات الأسبوعي المحدد من قبل طبيبك.

ما المقصود بأخطاء تناول الأدوية؟

عند استخدام أويكلي (Awiqli®)، من الضروري فهم احتمال وقوع أخطاء في تناول الدواء.

- قد تحدث أخطاء نتيجة الخلط غير المقصود بين أويكلي (Awiqli®) وأنواع أخرى من الأنسولين، خاصة الأنسولين سريع المفعول.
- يمكن أن تحدث أخطاء أيضاً بسبب إعطاء جرعات غير صحيحة من أويكلي (Awiqli®) خلال الانتقال من الأنسولين القاعدي اليومي إلى جرعة أسبوعية من أويكلي (Awiqli®).
- يُرجى استشارة الطبيب للتعرف على الفروقات في تصميم أويكلي (Awiqli®) وأقلام الأنسولين الأخرى.
- قبل استخدام أويكلي (Awiqli®)، تأكد من قراءة التعليمات بعناية في النشرة المرفقة بالعبوة.



تجنب الغلط

- إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من الأنسولين، يجب عليك دائماً التأكد من استخدام الأنسولين الصحيح من خلال التحقق من اسم الأنسولين وتركيزه قبل كل حقنة. تأكد من أن ملصق القلم يحمل اسم أويكلي (Awiqli®) وتركيز ٧٠٠ وحدة/مل قبل حقن الأنسولين.
- يمكن للقلم إعطاء جرعة تتراوح من ١٠ إلى ٧٠٠ وحدة من أويكلي (Awiqli®) في حقنة واحدة، مع إمكانية التعديل بجرعات مقدارها ١٠ وحدات.
- يجب دائماً استخدام عداد الجرعات ومؤشر الجرعة لاختيار الجرعة المناسبة، ولا تعتمد على صوت النقرات لتحديد الجرعة.
- على عكس أقلام الأنسولين الأخرى التي تسمح بتعديل الجرعة بوحده واحدة أو اثنتين، يتيح قلم أويكلي (Awiqli®) تعديلات في الجرعة بمقدار ١٠ وحدات في المرة الواحدة.
- تحقق دائماً من عدد الوحدات التي تم تحديدها قبل حقن الأنسولين الأسبوعي.
- إذا كنت كفيفاً أو تعاني من ضعف البصر، فلا تستخدم القلم دون مساعدة. اطلب المساعدة من شخص لديه رؤية جيدة ويدرك كيفية استخدام قلم أويكلي (Awiqli®).