

What should I know about Novarixan?

- Novarixan thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots.
- Novarixan must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, never skip a dose.
- You must not stop taking Novarixan without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase.

- Tell your health care provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Novarixan.
- Tell your health care provider that you are taking Novarixan before any surgery or invasive procedure.

When should I seek advice from my health care provider?

When taking a blood thinner such as Novarixan it is important to be aware of its possible side effects. Bleeding is the most common side effect.

Do not start taking Novarixan if you know you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor. Tell your health care provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness
- unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding.
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal.

- blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools.
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds.

How do I take Novarixan?

- 10 mg can be taken with or without food.
- 15 mg must be taken with food.
- 20 mg must be taken with food.



Manufacturer: Pharmathen International S.A, Greece

Marketing Authorization Holder:
Kinnova Manufacturing Company
Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia

Patient Alert Card

Novarixan 10mg ☐

Novarixan 15mg ☐

Novarixan 20mg ☐

- **Keep this card with you at all times.**
- **Present this card to every physician or dentist prior treatment.**

This document is approved by The Executive Directorate of Pharmacovigilance, at SFDA.

I am under anticoagulation treatment with Novarixan (rivaroxaban)

Name	Other medicines / conditions
Address	
Birth date	Weight

In case of emergency please notify:

Doctor's name

Doctor's phone

Doctor's stamp:

Please also notify:

Name

Phone

Relationship

Information for health care providers:

INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Novarixan.

Reporting of side effects

Saudi Arabia:

National Pharmacovigilance Centre at
Saudi Food and Drug Authority (SFDA):

- SFDA Call Center: 19999
- E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa
- Website: <https://ade.sfda.gov.sa/>

Other GCC States:

Please contact the relevant competent authority.



أنا أخضع لعلاج مضاد لتخثر الدم
مع نوفاريكسان (ريفاروكسابان).

في حالة الطوارئ
يرجى إعلام:

يرجى أيضاً إعلام:

معلومات لمقدمي الرعاية
الصحية:

لا ينبغي استخدام قيم INR لأنها لا
يمكن الاعتماد عليها في قياس مدى
فعالية نوفاريكسان كمضاد لتخثر الدم.

التبليغ عن الآثار الجانبية

المملكة العربية السعودية:
المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة
العامة للغذاء والدواء: ١٩٩٩٩
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
الموقع على الشبكة: /https://ade.sfd.gov.sa

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:
يرجى الاتصال بالجهة المختصة ذات العلاقة.



الاسم

أدوية أخرى/شروط

العنوان

تاريخ الميلاد

الوزن

اسم الطبيب

هاتف الطبيب

ختم الطبيب:

الاسم

الهاتف

العلاقة

ما الذي يجب أن أعرفه عن نوفاريكسان؟

- نوفاريكسان يخفف الدم، وبالتالي يمنع حدوث جلطات دموية خطيرة.
- يجب أن يؤخذ نوفاريكسان بالضبط على النحو الذي يحدده طبيبك، لضمان الحماية الكاملة من جلطات الدم، أحرص على عدم تفويت أي جرعة.
- يجب ألا تتوقف عن تناول نوفاريكسان دون التحدث إلى طبيبك أولاً، حيث أن خطر الإصابة بجلطات الدم سيزداد.

- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية أخرى تتناولها حالياً، أو تناولتها مؤخراً أو تنوي البدء بتناولها، قبل أن تبدأ بتناول دواء نوفاريكسان.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأنك تتناول دواء نوفاريكسان قبل أي عملية جراحية أو إجراء جراحي.

متى يجب أن أطلب المشورة من مقدم الرعاية الخاص بي

عند تناول مميعات الدم مثل نوفاريكسان من المهم أن تكون على دراية بآثاره الجانبية المتعلقة بالنزيف وهو من الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً.

لا تبدأ بأخذ دواء نوفاريكسان إذا كنت تعلم أنك في خطر التعرض للنزيف، دون مناقشة هذا أولاً مع طبيبك. أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي من علامات أو أعراض النزيف التالية:

- شعور بألم
- تورم أو انزعاج.
- صداع أو دوخة أو ضعف.
- كدمات غير عادية، نزيف في الأنف، نزيف من اللثة، الجروح التي تستغرق وقتاً طويلاً لوقف النزيف.
- تدفق الحيض أو النزيف المهلي أكثر من المعتاد.

- دم في البول قد يكون وردياً أو براز بني أو أحمر أو أسود.
- سعال الدم أو تقيؤ الدم أو خروج مواد تشبه القهوة المطحونة.

كيف أتناول نوفاريكسان؟

لضمان الحماية المثلى، يجب أخذ دواء نوفاريكسان:

- ١٠ ملغم: يمكن تناوله مع أو بدون طعام
- ١٥ ملغم: يجب تناوله مع الطعام
- ٢٠ ملغم: يجب تناوله مع الطعام

Kinnova

الشركة الصانعة: فارماثين، اليونان

الشركة مالكة حق التسويق:

شركة كين وفا للصناعة، الرياض - السعودية

بطاقة تنبيه المريض

- ☐ نوفاريكسان ١٠ ملغم
- ☐ نوفاريكسان ١٥ ملغم
- ☐ نوفاريكسان ٢٠ ملغم

● احتفظ بهذه البطاقة معك على الدوام.

● أبرز هذه البطاقة لكل طبيب أو طبيب أسنان قبل البدء بأي علاج.