



دليل متلقي اللقاح للعبوات ذات الأغشية البرتقالية

دليل متلقي اللقاح لآباء الأطفال الذين سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19

سيتم تطعيم طفلك بلقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 لمنع الإصابة بمرض الكورونا 2019 (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس سارس-كوف-2. سيساعدك هذا الدليل على فهم مخاطر ومزايا لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تطعيم طفلك، لأنه يحتوي على المعلومات المهمة التي يجب أن تعرفها.

- ابق على هذا الدليل معك؛ فربما تضطر لقراءته مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي استفسارات، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو طاقم التمريض.
- إذا ظهر على طفلك أي أعراض، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو أحد أفراد طاقم التمريض. سيساعدك هذا الدليل على معرفة الأعراض الجانبية المحتملة للقاح.

هذا الدليل مُصدق عليه من قِبل الإدارة التنفيذية لليقظة الدوائية بهيئة الدواء والغذاء السعودية.

ما هو مرض كوفيد-19؟

- كوفيد-19 هو مرض يسببه فيروس السارس-كوف-2. قد يتعرض طفلك للعدوى بمرض كوفيد-19 عن طريق مخالطة شخص مصاب بالفيروس. إن كوفيد-19 هو الأساس مرض تنفسي يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم. قام المصابون بالمرض بالتبليغ عن كثير من الأعراض، منها الخفيف ومنها الحاد.
- تبدأ الأعراض بالظهور من يومين إلى 14 يوماً بعد التعرض للفيروس، وتتضمن الحمى أو الرعشة والكحة وعدم القدرة على التنفس والإعياء وآلام العضلات والصداع وفقدان الشم والتذوق وآلم الحلق واحتقان الأنف والغثيان والقيء والإسهال.

ما هو لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19؟

- يعتمد اللقاح على نوع من أنواع الحمض الريبوزي للفيروس، لتنشيط المناعة ومنع الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس سارس-كوف-2.
- يتم إعطاء اللقاح للأفراد من عمر 5 سنوات إلى 11 سنة. لا يمكن إعطاء اللقاح للأفراد أصغر من 5 سنوات.
- بالنسبة للمراهقين من عمر 12 سنة إلى 17 سنة، يستخدم لقاحاً بتركيب مختلف وتحضير مختلف للقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19.

ما الذي يجب أن تعرفه قبل أن يأخذ طفلك اللقاح؟

- لا يجب إعطاء لقاح كوفيد-19 المعتمد على الحمض الريبوزي في حالات الحساسية لأي من المواد المستخدمة في صنعه.
- تتضمن علامات الحساسية الطفح الجلدي المسبب للحكة وضيق التنفس وتورم الوجه واللسان.
- تواصل مع طبيبك أو مقدم الخدمة الصحية على الفور أو خذ طفلك لأقرب غرفة طوارئ إذا ظهر عليه أية أعراض للحساسية، فمن الممكن أن تكون خطيرة.

ماذا يجب أن تبلغ الشخص الذي سيقدم اللقاح لطفلك ، قبل أن يحصل على لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19؟

يجب أن تبلغ الشخص الذي سيقوم بإعطاء اللقاح لطفلك كل شيء يخص حالته الصحية، يتضمن ذلك:

- الحساسية من أي شيء.
- وجود التهاب بعضلة القلب أو الغشاء المبطن للقلب.
- الحمى.
- نقص المناعة أو أخذ الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي.
- إذا قام بأخذ لقاح آخر لمرض كوفيد-19.
- الأدوية التي أخذها حديثاً أو التي يأخذها الآن أو الأدوية التي من الممكن أن يأخذها قريباً.
- إذا كان لديه سيولة بالدم أو يتعاطى أدوية تزيد من سيولة الدم.
- إذا كان قد تعرض من قبل لحالة إغماء بعد أخذ أي حقن.

كيف يتم إعطاء اللقاح؟

يتم إعطاء اللقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 في الجزء العضلي من الذراع العليا على جرعتين، تحتوي كل منهما على 0.2 مل، ويفصل بينهما ثلاثة أسابيع، للأفراد من عمر 5 سنوات إلى 11 سنة.

ما الذي يجب فعله بعد التطعيم؟

يجب عليك مراقبة طفلك لمدة 15 دقيقة بعد اللقاح، على أن تطول تلك المدة بعد الفحص الطبي. هناك فرصة مستبعدة لأن يسبب اللقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 رد فعل مناعي حاد "حساسية".

غالباً ما يحدث رد الفعل المناعي الحاد أو الحساسية بعد دقائق قليلة من أخذ اللقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 قد تصل إلى ساعة واحدة.

علامات حدوث الحساسية الحادة

- صعوبة التنفس وتورم الوجه والحنك.
- سرعة ضربات القلب والطفح الجلدي في أنحاء الجسم كافة.
- الدوخة والضعف.
- يجب أن تأخذ طفلك لمقدم الخدمة الصحية فوراً إذا ظهر عليه أي من تلك الأعراض بعد تلقي لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19:
- ألم الصدر.
- ضيق التنفس.
- تسارع ضربات القلب أو اضطرابها، أو قوتها.

هل من الممكن أن يتلقى طفلك لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 مع اللقاحات الأخرى؟

إذا كنت تنوي إعطاء طفلك لقاح فايزر بيونتك كوفيد-19 مع لقاحات أخرى، عليك مناقشة ذلك مع الطبيب المتخصص في علاج طفلك.

ليست هناك أي معلومات عن استخدام لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 مع اللقاحات الأخرى.

ما هي الأعراض الجانبية الممكن ظهورها للقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19؟

ككل اللقاحات، لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 من الممكن أن يسبب أعراض جانبية، برغم أنها لا تحدث لجميع الأفراد الذين يتلقونه.

من الأعراض الجانبية التي تم الإبلاغ عنها من متلقي لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19:

آثار جانبية شائعة جداً

- الألم في موضع الحقن والتورم والاحمرار
- الإعياء
- الصداع
- ألم العضلات
- ألم بالذراع
- الشعور بالتعب
- الحمى والرغبة
- ألم المفاصل
- الإسهال
- الحمى

الآثار الجانبية الشائعة: قد يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص.

- احمرار موضع الحقن
- الغثيان
- القيء

الآثار الجانبية غير الشائعة: قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص

- تضخم الغدد الليمفاوية (لوحظ أكثر بعد جرعة التعزيز)
- الشعور بتوسع
- ألم الذراع
- حكة موقع الحقن
- الطفح الجلدي
- الشعور بالضعف أو نقص الطاقة / النعاس
- فقدان الشهية

الآثار الجانبية النادرة: قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 1000 شخص

- تدلي الوجه من جانب واحد مؤقتاً
- بعض أعراض الحساسية كالقشعريرة و تورم الوجه

غير معروف (لا يمكن تقديره من البيانات المتوفرة)

- الحساسية الشديدة
- التهاب عضلة القلب
- التهاب الغشاء المبطن لعضلة القلب و الذي يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس أو الخفقان أو ألم في الصدر

قد لا تكون تلك الأعراض هي الأعراض الممكنة للقاح. قد تحدث أعراض شديدة وغير متوقعة جراء تلقي اللقاح. مازالت التجارب السريرية تدرس الأعراض المحتملة لتلقي اللقاح.

و بعض هذه الآثار الجانبية تكون أكثر حدوثاً في المراهقين ذوو 12-15 عاماً عن البالغين.

ما الذي ينبغي أن تفعله إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض الجانبية؟

أغلب الأعراض الجانبية للقاح تكون من خفيفة إلى متوسطة في حدتها وغالباً ما تختفي بعد أيام قليلة. إذا سببت الأعراض الجانبية كالآلم أو الحمى مشكلة، يمكن علاجها بالأدوية مثل الباراسيتامول.

إذا ظهرت على طفلك أعراض لحساسية شديدة، عليك أخذه إلى أقرب مستشفى.

إذا كانت الأعراض تضايق طفلك أو كانت مستمرة في الظهور، عليك التحدث لمقدم اللقاح أو للطبيب المعالج لطفلك.

هل يمكن أن يتسبب لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 في عدوى طفلك بمرض كوفيد-19؟

لا. لقاح فايزر-بيونتيك كوفيد-19 لا يحتوي على فيروس سارس-كوف-2 ولا يمكن أن يتسبب في العدوى بمرض كوفيد-19.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

يمكنك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للقاح فايزر-بيوننتيك كوفيد-19 عن طريق

المركز القومي لليقظة الدوائية: Email:npc.drug@sfd.gov.s Website <https://ade.sfda.gov.sa>

أو الاتصال برقم: **19999**

قسم اليقظة الدوائية بشركة فايزر :

Mobile: +966 53 9069565

Email: SAU.AEReporting@pfizer.com

Tel: +966 2 2293633